단백질 합성 및 해독·간질환 치료제

에바치온® 캅셀

EVATHION® Caps

일반의약품	분류번호:392

에바치온 캅셀은 생체내의 산화환원 기구에 관여하는 환원형 글루타치온제제입니다. 글루타치온은 L-Glutamic acid, L-Cysteine 및 Glycine으로부터 합성된 활성 SH기를 가진 Tripeptide로서 1921년 Hopkins에 의해 발견되었으며 동식물, 미생물계의 각 조직에 광범위하게 분포되어 있는 성분입니다.

에바치온캅셀은 생체내의 산화, 환원작용을 원활히 하고 펜토오스 인산경로(Pentose phosphate cycle)를 활성화시킴에 따라 단백동화작용 및 단백질 생합성을 향상시키고 여러가지 효소반응 및 당질, 지질 등의 유기질 대사를 촉진시킵니다. 또한, 생체내의 이물 및 금속의 체외배설작용과 해독작용을 촉진하여 각종 간질환 및 약물에 의한 중독, 알코올중독에도 우수한 치료효과를 나타냅니다.

따라서, 에바치온캅셀은 단백질 합성 및 해독작용과 간질환에 효과적인 치료제입니다.

성 상

백색-회백색의 가루가 든 상, 하 농황색의 경질캅셀제

원료약품 및 그 분량

1캅셀 중

글루타치온 (환원형) 50mg

(식품의약품안전청고시)

효 능 및 효 과

1. 주효능·효과 : 급·만성 간염의 치료 보조제
2. 다음 환자에 사용할 수 있다 : 약물중독, 알코올중독

용 법 및 용 량

L-글루타치온으로서 보통 성인 1일 3회, 1회 50~100mg(1~2캅셀)씩 경구투여한다.

⬇ 뒷면계속

ISO 9001 | K G M P

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 서울 : 서울특별시 송파구 가락본동 98-3
· 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
· 부산 : 부산광역시 서구 동대신동 1가 112
· 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

약리작용 및 특징

1. 생체형 산화환원계에 관여합니다.
   글루타치온은 생체내에서 산화형-환원형 사이를 상호 전이하여 수소공여체 또는 수용체로 작용하여 산화, 환원의 완충역할을 합니다.
2. 각종 해독작용에 관여합니다.
   글루타치온은 생체내 금속물질과의 결합에 의한 체외배설작용 및 멜칼톨산 결합(Cysteine 포합), 글루크론산 포합, 글리신 포합, 로단화 등에 관여하여 여러가지 해독작용을 촉진시킵니다.
3. 간질환의 예방 및 치료
   체내 글루타치온이 감소하면 간장의 방어력이 저하되는데 글루타치온은 간장 질환의 예방과 치료에 도움을 줍니다.
4. 단백동화작용 촉진
   펜토오스 인산경로(Pentose phosphate cycle)를 활성화시킴에 따라 단백질 생합성을 향상시킵니다.
5. 각종효소를 보호하고 활성화시킵니다.
   글루타치온은 중금속이나 산화에 의해 SH계 효소 및 이가철효소가 불활성화 되는 것을 방지함과 동시에 비활성화된 효소를 부활시킵니다.
6. 각종 조효소로 작용하여 당질, 단백질, 지질 등의 유기질 대사를 촉진합니다.
   글루타치온은 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Glyoxalase, Maleylacetoacetate isomerase 등의 보호소로 작용하여 당질, 단백질, 지질 대사를 촉진합니다.
7. 항 Allergy 작용을 나타냅니다.
   SH계 효소의 Cholinesterase를 부활시켜 Acetylcholinesterase 평형실조를 개선하여 항 Allergy 작용을 나타냅니다.

사용상의 주의사항

1. 부작용
   1) 과 민 증 : 드물게 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있다.
   2) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 일어날 수 있다.

저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
  만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질,변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국이나 본사 및 각 영업소에서 교환해 드립니다.

제정 : 99. 5.(Rev.0)