대한 5%포도당가 생리식염액
Glucose & Sod. Chloride Inj.

전문의약품

▶원료약품의 분량
1000mL중
주성분 : 포도당 (K.P.) 50.0g
염화나트륨 (K.P.) 9.0g
용해제 : 주사용수(K.P.) ..... 적량

▶성상 : 약간의 짠맛과 단맛이 있는 무색투명한 액을 무색투명한 유리 또는 폴리프로필렌,폴리염화비닐,다층필름플라스틱재질의 용기에 충진한 것

▶효능및효과 탈수증, 수분 · 전해질보급, 수술전후의 수분 · 전해질 보급.

▶용법 및 용량
보통 성인1일 500~1,000ml(시간당 250-500ml 또는 분당 60-120방울)을 2-3회 나누어 점적정맥주사한다. 유유아에 대하여는 시간당 15-60ml 또는 분당 4-15 방울을,노인에 대하여는 시간당 250ml 또는 분당 60방울의 속도로 점적정맥주사한다. 투여량, 투여속도는 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

▶사용상의 주의사항
1. 경고
포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 차아민 (비타민B_1)소모율이 높기때문에 순간적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.

2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
① 신질환에 기인하는 신부전 환자. ② 심부전 환자. ③ 고장성 탈수증 환자.
④ 폐쇄성 요로질환으로 인해 요량이 감소하고 있는 환자. ⑤ 당뇨병 환자.

3. 부작용
① 대량급속투여하면 뇌부종, 폐수종, 말초의 부종, 아시도시스, 수중독이 나타날 수 있다.
② 신생아, 미숙아에 급속투여(시간당100ml이상)하면 수중독이 나타날 수 있다.
③ 주입정맥에서 혈전증이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의
① 유아및 고령자에게는 급속주입이나 장시간 투여해서는 안된다.
② 고령자에의 투여시 특히 심한 심부전 및 신부전 환자에게는 순환계에의 과부하를 피하기위해 주의하여 투여하여야 한다.
③ 과량투여시 처치는 이뇨제를 투여한다.

5.보관및 취급상의 주의 : 실온보존.
*멸균한 주사기나 수액셋트를 사용하십시오.
*주의 : 의사의 처방 또는 지시에 따라 사용하십시오.

▶저장방법 : 밀봉용기
▶포장단위 : 500,1000ml

★사용기한이 경과되었거나 부유물질, 침전, 변색, 뚜껑의 결함(변질, 변패 또는 오손된 것)이 있을때는 사용하지 말 것이며 약국, 도매상, 병의원등의 개설자에 한하여 구입처에서 신품으로 교환하여 드립니다.

★부작용 확인:항생제, 비타민제, 간장약, 진통진경제와 기타 여러가지 타약제를 혼합처방 사용할때는 부작용이 나타나는 수가 있으므로 타약제의 부작용을 충분히 숙지한 다음 신중히 관찰하면서 투여하십시오.

재작성일 2003.4.10

제조원
대한약품공업주식회사
공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1