대한 하트만덱스 주사액

포도당 락토링겔 주사액

전문의약품

【원료약품의 분량】

1000mL중

포도당 (약전)	50.0g
염화나트륨 (약전)	6.0g
염화칼륨 (약전)	0.3g
염화칼슘 (약전)	0.2g
젖산나트륨액 (U.S.P.)	6.2g
(젖산나트륨으로서 3.1g)	
주사용수 (약전)	적량

: 총나트륨(Na:22.99)으로서 2.9962g, 칼륨(K:39.10)으로서 0.1573g, 총염소(Cl:35.45)로서 3.8786g

【성상】

약간의 짠맛과 단맛이 있는 무색투명한 액을 무색투명한 유리 또는 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 다층필름플라스틱 재질의 용기에 충진한 것

【효능 · 효과】

순환혈액량 및 조직간액의 감소시 세포외액의 보급, 보정, 대사성아시도시스(산증)의 보정, 에너지 보급.

【용법 · 용량】

보통 성인 500~1000mL를 점적 정맥주사한다.
투여속도는 포도당으로서 매시간 체중 kg당 0.5g이하로 한다.
투여량, 투여속도는 연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
   포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민 B_1) 소모율이 높기 때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   젖산혈증환자
3. 다음 경우에는 신중히 투여할 것
   1) 신질환에 기인하는 신부전 환자 2) 심부전 환자
   3) 고장성탈수증 환자
   4) 폐쇄성요로질환으로 인해 요량이 감소하고 있는 환자
   5) 심한 간장애 환자
4. 부작용
   대량 급속투여시 뇌부종, 폐수종, 말초의 부종이 나타날 수 있다.
5. 적용상의 주의사항
   1) 칼슘을 함유하고 있으므로 구연산을 가한 혈액과 혼합하면 응혈을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
   2) 인산이온 및 탄산이온과 침전을 생성하므로 인산 또는 탄산을 함유하는 제제와 배합하지 않는다.
6. 보관 및 취급상의 주의 : 실온보존
   *멸균한 주사기나 수액셋트를 사용하십시오.
   *주의 : 의사의 처방 또는 지시에 따라 사용하십시오.

【저장방법】 밀봉용기

【포장단위】 250, 500, 1000mL

★ 사용기한이 경과되었거나 부유물질, 침전, 변색, 뚜껑의 결함(변질, 변패 또는 오손된 것)이 있을때는 사용하지 말것이며 약국, 도매상, 병의원등의 개설자에 한하여 구입처에서 신품으로 교환하여 드립니다.

★ 부작용확인 : 항생제, 비타민제, 간장약, 진통진경제와 여러가지 타약제를 혼합처방 사용할 때는 부작용이 나타나는 수가 있으므로 타약제의 부작용을 충분히 숙지한 다음 신중히 관찰하면서 투여하십시오.

재작성년월일 2003. 6. 20

제조원
대한약품공업주식회사
공장 : 경기도 안산시 단원구 원시동 736-1