대한 젖산나트륨·염화나트륨·포도당주
(Lactated Saline Glucose inj.) 1:2:3

전문의약품

【원료약품의 분량】 1000mL 중

포도당(K.P) 25g
염화나트륨(K.P) 3g
젖산나트륨액(K.P) ..... 6.4g (젖산나트륨으로서 3.2g)
주사용수(K.P) ..... 적량

【성상】
약간의 단맛이 있는 무색투명한 액을 무색투명한 유리 또는 플라스틱 용기에 충진한 것이다.

【효능 · 효과】
탈수증, 수분 · 전해질 보급, 수술 전후의 수분 및 전해질 보급

【용법 · 용량】
보통 성인 1회 500~1,000mL를 점적정맥 주사한다. 투여속도는 성인의 경우 시간당 300~500mL(분당 80~130방울), 소아의 경우 시간당 50~100mL로 한다. 투여량, 투여속도는 연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1.경고
포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민B_1) 소모율이 높기 때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.
2.다음 환자에는 투여하지 말 것.
젖산 혈증환자
3.다음 경우에는 신중히 투여할 것.
1)신질환에 기인하는 신부전 환자 2)심부전이 있는 환자 3)당뇨병 환자
4) 폐쇄성 요로질환으로 인해 요량이 감소하고 있는 환자 5)심한 간장애 환자
4.부작용
1) 대량 급속 투여시 뇌부종, 폐수종, 말초의 부종이 나타날 수 있다.
2) 항생제, 비타민제, 간장약, 진통진경제와 기타 여러가지 타약제를 혼합처방 사용할 때는 부작용이 나타나는 경우가 있으므로 타약제의 부작용을 충분히 숙지한 다음 신중히 관찰하면서 투여하십시오.
5.적용상의 주의사항 : 완전히 맑지 않은 것은 사용하지 말 것.
6.보관 및 취급상의 주의 : 실온보관
※주의 : 의사의 처방 또는 지시에 따라 사용하십시오.
※멸균주사기나 수액셋트를 사용하십시오.

【저장방법】 밀봉용기

【포장단위】 500, 1000mL

※사용기한이 경과되었거나 부유물질, 침전, 변색, 뚜껑의 결함(변질, 변패, 오손된 것)이 있을 때에는 사용하지 말 것이며 약국, 도매상, 병의원등의 개설자에 한하여 구입처에서 신품으로 교환하여 드립니다.

작성년월일 2001. 6. 1

제조원
대한약품공업주식회사
공장 : 경기도 안산시 원시동 736-1