| 일 반 의 약 품 |
| --- |
| 264 : 진통,진양,수렴,소염제 |

근육 · 관절의 통증에

# 로시덴 겔

## 피록시캄

**로시덴겔**은 비스테로이드성 소염 · 진통제인 피록시캄을 주성분으로 하는 경피흡수형 겔제제로서 염증 및 통증에 관여하는 Prostaglandin의 생합성을 억제하여 항염증 · 진통작용을 나타냅니다. 기존의 경구 및 주사제와는 달리 국소적인 통증에 적용함으로써 부작용을 감소시키며 효과를 나타내도록 개발된 제제입니다.

**【성분 · 함량】** 1g중

피록시캄(유.에스.피.) ····· 5mg

**【성상】**

에탄올 냄새가 나는 황색 투명한 겔 상태의 연고제입니다.

**【효능 · 효과】**

1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   골관절염(퇴행성 관절질환), 견관절주위염, 건염, 건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스엘보 등), 근육통(근염, 근막염 등), 외상후 염증 및 동통

**【용법 · 용량】**

성인 : 1회 1g(약 3cm) 1일 3~4회 질환부위에 바르고 가볍게 문지릅니다.
보통 1~2주간 치료로 충분하나 증상에 따라 4주까지 치료가 필요합니다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에게는 사용하지 마십시오.
   이 약 또는 피록시캄 경구제에 과민증의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 부작용
   피부 : 때때로 국소의 가려움증, 발적, 발진, 겨모양의 박리, 피부염, 드물게 광과민증이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 심할 경우에는 사용을 중지하십시오.
4. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하십시오.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 약물요법이외의 치료법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.
   3) 피부의 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 사용하십시오.
5. 임부, 어린이에 대한 사용
   1) 임부에 대한 안정성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 사용하십시오.

2) 어린이에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

6. 적용상의 주의

1) 눈 및 점막에 사용하지 않습니다.

2) 밀봉포대법으로 사용하지 않습니다.

3) 피부에 손상이 있을 경우에 사용하면 일과성의 자극감이 있을 수 있으므로 주의하십시오.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온보관

**【포장단위】** 10, 20, 30, 60, 100, 200, 450g

※유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

3-0260

설명서 작성년월일 19880530

개정년월일 20000727

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여

신풍제약주식회사

경기도 안산시 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2