Healon

PHARMACIA

원료약품의 분량 및 성상

1ml중
히알우론산나트륨(보건원고시) ····· 10mg

무색의 점조성이 있는 액으로 1회용 용기에 들어있는 주사제

효능· 효과

백내장수술(수정체이식), 각막이식수술, 녹내장수술 등 각종 안과수술보조제

용법· 용량

1. 백내장 수술 및 안내 렌즈 이식술 : 이 약 필요량을 바늘 또는 캐눌라를 통해 수정체 제거 전 또는 후에 안구전방에 천천히 주입합니다. 백내장 적출전 및 안내렌즈 삽입전에 주입되야만 보조제로서의 각막내피 보호효과가 최적일 수 있으므로 낭내 및 낭외 백내장 수술전에 주입합니다. 이 약은 수술기구 및 삽입될 안내렌즈의 코팅에 사용될 수 있습니다.
2. 각막이식술 : 각막이식편을 제거하고 각막표면과 수위가 맞을 때까지 이 약으로 전방을 채운다. 이 약 위에 공여 이식편을 놓고 봉합합니다.
3. 녹내장 여과술 : 섬유주 절제술동안 전방용량을 보충하고 유지하기 위해 이 약을 각막천자를 통해 주입합니다.

※사용상의 주의사항

다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 성분 및 단백질계 약물에 과민증의 병력이 있는 환자

부작용

- 눈 : 때때로 안압 상승, 드물게 염증반응, 각막부종, 각막혼탁, 전방출혈, 홍체 신생혈관, 홍체 후궤양, 결막유착부전, 산동, 수정체 혼탁, 동통, 소양증, 시력불선명, 각막 대상기능장애 등이 나타날 수 있습니다.
- 기타 : 때때로 안내 렌즈 표면의 혼탁이 생길 수 있습니다.

일반적 주의

- 특히 수술 직후 주의깊게 안압을 조사하고 안압상승이 일어나면 적절한 처치를 합니다.
- 가능한 한 수술후 세정, 흡인 등에 의해 이 약을 제거하는 것이 바람직합니다.
- 초음파유화흡인술을 하기 전에 흡인관류를 하여, 수정체와 이 약과의 사이에 관류액으로 채워진 공간을 만들어야 합니다.
- 염화벤잘코늄 등과 같은 4급 암모늄을 함유하는 용액으로 수술용구 등을 세척해서는 안 됩니다.
- 이 약은 조류세포에서 분리 정제된 것으로 투여시 면역학적 및 다른 잠재적인 위험이 발생할 수 있음을 주지해야합니다.

상호작용

히알우로니다제와 병용투여하지 않습니다.

적용상의 주의

1) 투여경로 : 안과용으로 용법·용량에 따라 투여하고 절대로 혈관내에 주입하지 않습니다.
2) 투여시

1. 냉소에 보관하고 사용전 실온에서 30분간 방치한 후 사용합니다.
2. 이 약은 염화벤잘코늄 등 제4급 암모늄 및 클로르헥시딘에 의해 침전을 생성하므로 충분히 주의합니다.
3. 개봉후의 사용은 1회로 하고 잔액은 용기와 함께 폐기합니다.
4. 이 약과 공기를 혼합하여 사용할 경우 홍체 아래 공기가 들어가지 않도록 주의합니다.
5. 주의깊게 천천히 주입합니다.
6. 전방내에 주입할 경우 과다하게 주입되지 않도록 합니다.(수술후 안압상승의 원인이 될 수 있습니다.)

저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다
- 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다

저장방법 및 사용기간

2~8°C 차광저장, 밀봉용기, 얼지않도록 보관, 사용기간: 3년

포장

힐론지브이 주 0.55ml x 1관, 0.85ml x 1관

※유통도중 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 의약품은 교환하여 드리오니 담당영업사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다.

작성년월일 : 1994. 5. 12
※개정년월일 : 2003. 5. 21
19-614011-000C