

휴온스

진해거담제

아세틸시스테인 캡슐 200mg

Acetylcysteine 200mg

500캡슐

Huons

일반의약품/분류번호 : 222

■ 원료약품의 분량 1캡슐 중
아세틸시스테인 (U.S.P.) 200mg

■ 성 상
흰색의 내용물이 든 상부 하늘색, 하부 흰색의 경질캡슐제

■ 효능·효과
1. 주효능 효과
1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 :
급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지
천식, 세기관지염, 만성염증증
2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

■ 용법·용량
아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께
경구투여한다.
1. 급성질환
성인 : 1회 200mg 1일 3회
소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환
성인 : 1회 200mg 1일 2회
소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 만성염증증
소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg
1일 4회
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사
등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명,
기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린,
에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용투여시 항생물질의
약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고
투여한다).
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우
에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이
모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여
한다.
7. 적응상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

■ 저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 유통과정
에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이
발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수
있습니다.

작성일 : 2007.07.05

8809032123945



주식회사 휴온스

경기도 화성시 향남면 상신리 907-6
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

제조번호 :
사용기한 :