일반의약품
분류번호:117

훼라민-큐 정

여성은 평균 45~55세가 되면 폐경을 경험하게 되는데 이때 단순한 생리 중단 이외에 안면홍조 발한, 두통, 현기증, 심계항진, 우울증, 수면장애 등의 각종 신체적·정신적 이상 증상을 동반합니다. 이는 Estrogen(여성호르몬)변화에 관계가 있으며 또한 여성의 사회적·심리적 불안감으로 자주 수면장애, 우울증 같은 정신집중장애 증상을 수반합니다.
훼라민큐정은 폐경기의 제증상에 유효한 승마추출액과 심리적 안정작용을 가진 생약인 히페리시 건조엑스의 생약복합제로서 지금까지 폐경기 증후군 치료에 사용되어온 호르몬제제나 항우울제와는 달리 여성호르몬 변화에 따른 신체적 증상에서 폐경기 심리적 불안정에 따른 정신적 증상까지 효과적으로 개선하며 우수한 내약성을 가져 안전하게 장기 치료에 사용할 수 있습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정중
승마추출액(식품의약품안정청고시 제2000-14호) ····· 0.0364mL(27-deoxyactein으로서 1.0mg)
히페리시 80% 메탄올 건조엑스(별규) ····· 84mg(hypericin으로서 0.25mg)

[성 상] 진한 녹색의 원형 필름코팅 정제

[약리 작용 및 특징]
1) 훼라민큐정은 뇌하수체에서 황체형성 호르몬의 분비를 차단하며 에스트로겐 유사작용을 가져 폐경기 이상 증상에 뛰어난 효과를 가진 생약인 승마추출액에 신경전달물질의 파괴와 재흡수를 막는 복합적인 작용기전으로 심인성 폐경기 장애에 우수한 효과를 나타내는 히페리시 건조엑스를 첨가하여 폐경기의 신체적, 정신적 제증상을 효과적으로 치료합니다.
2) 훼라민큐정은 4주후 환자의 약 89%가 증상 개선을 나타내었으며 특히 의기소침, 수면 부족등의 대표적인 우울증 증상이 높은 비율로 개선되었습니다.
3) 훼라민큐정은 과학적으로 약효가 입증된 생약복합제로 정신적 의존성이나 습관성 없이 장기간 사용이 가능하여 대부분 장기간의 치료를 요하는 갱년기 장애 치료에 적합합니다.
4) 훼라민큐정은 적용대상이 광범위하며 특히 폐경환자에는 생리를 다시 유도하지 않아 노년기 환자의 거부감을 유발하지 않고 적용이 가능합니다.

[효능·효과]
폐경기의 다음 증상
· 홍조, 발한, 의욕저하
· 의기소침, 정신적 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불면, 불안 또는 불쾌함 등의 자율신경 장해
· 생리전의 불수의적(psychovegetative)이상 증상

[용법·용량]
1회 1정씩 1일 2회. 필요시 1회 2정씩 1일 2회 복용.
아침, 저녁 씹지 않고 물과 함께 복용한다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약의 성분에 과민한 환자.
   2) 기지의 피부 광과민성 환자
   3) 임부 및 수유부(사용 경험이 충분하지 않습니다.)
2. 부작용
   1) 햇볕에 대한 피부의 민감성이 증가하는 광과민 반응이 특히 피부가 흰 사람에게서 유발될 가능성이 있습니다.
   2) 드물게 피로, 불안, 위장관 장애가 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의

1) 만약 약물 등에 알러지가 있거나 해당 질환을 위해 다른 약제를 복용하고 있다면 의사나 약사에게 알리십시오.

2) 만일 이 약의 효과가 너무 강하거나 너무 약하다고 생각되면 의사나 약사에게 상의하십시오.

4. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로 이효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중농도를 감소시킬 수 있습니다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용시는 부작용 발현여부 및 아래 사항에 주의해야 합니다.

1) HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등) 항레트로바이러스약(에피비렌츠, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있습니다.

2) 쿠마린계 항응고제(펜프로쿠몬, 와파린 등), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스수화물 등), 강심약(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 콜린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 항우울약(이미프라민, 아미트립딜린, 노르트립틸린 등), 항암제(사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)과 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요합니다.

3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스트렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있습니다.

4) 선택적 세로토닌재흡수저해제 등 관련 항우울약(시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 세르트랄린, 네파조돈 등), 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 부작용이 증가할 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에 대한 충분한 사용경험이 없으므로 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[포장 단위]

10, 60, 90, 100, 120, 180, 300정

[저장 방법]

기밀 용기, 실온(1~30℃)보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품의 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 약국 개선자 및 의약품 판매업자 또는 병·의원 등 유통경로를 통하여 교환해 드립니다.

0301
0104

제조발매원
동국제약주식회사
충청북도 진천군 광혜원면 죽현리 488-5

■ 학술부:(02)2191-9855~6 ■ 공장:(043)535-0121 ■ 수신자 부담전화:080-777-5678(본사) 080-777-5679(공장)