염증 기인성 경증 및
중등도 통증의 완화

〈전문의약품〉〈마약〉

씨·아이·에이® 캅셀

분류번호 : 811

【원료약품 및 그 분량】
1캅셀 중
아세트아미노펜(약전) ····· 250밀리그람
이부프로펜(약전) ····· 200밀리그람
인산코데인(약전) ····· 10밀리그람

【성　　상】
백색의 분말이 충진되어 있는 상부 불투명 녹색, 하부 불투명 적색의 경질캅셀

【효능·효과】
염증 기인성 경증 및 중등도 통증의 완화

【용법·용량】
성인(13세 이상) : 1회 1~2캅셀을 4시간 간격으로 복용. 1일 최대 12캅셀

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   4주이상 연속하여 투여하지 말 것
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 중증의 간장애 환자
   2) 중증의 신장애 환자
   3) 소화성궤양 환자
   4) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
   5) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
   6) 호흡 예비력 저하 환자
   7) 기관지 천식 환자
   8) 만성 폐질환에 의한 원발성 심부전 환자
   9) 두부손상 및 두개내압 상승이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 간장애 환자
   2) 신장애 환자
   3) 갑상선 기능저하증 환자
   4) 전립선 비대증 환자
   5) 부신피질기능저하증 환자
   6) 쇼크 환자
   7) 염증성 또는 폐색성 장질환 환자

【저장방법】
밀폐용기

【포장단위】
자사포장단위

※사용기한이 경과되었거나 변질,변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

☎ 소비자상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조원·판매원
명문제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 901-1
www.mmpharm.co.kr

〈설명서 작성년월 : 00. 11〉
〈설명서 개정년월 : 01. 2〉
〈M03〉