

브라덱신[®]캡슐

K G M P

적격업체제품

브라덱신[®]캡슐은 s-carboxymethylcysteine과 sobrerol이 복합처방되어 있는 진해거담제로서 기관지염, 기관지확장증, 기관지폐렴, 폐결핵이나 진폐증이 수반되는 기관지 카타르, 그리고 비인두염, 후두기관염 등의 점액·점액 농분비물의 용해, 배출에 사용되는 제제로서 다른 약제와의 배합금기가 없어 성인, 노약자 등에 광범위하게 사용할 수 있습니다.

성상	백색내지는 미백색의 분말이 들어있는 상:청색, 하:백색의 경질캡슐제
성분·함량	1캡슐 중 에스카르복시메칠시스테인 (약전) 375mg 소브레롤 (식약청고시 제 98-127호)..... 60mg
효능·효과	1. 다음 질환에서는 점액 및 점액농분비물의 용해, 배출 1) 기관지염, 기관지확장증, 기관지 폐렴, 특히 천식, 폐기종등의 호흡기부전이 수반될 때 2) 폐결핵이나 진폐증이 수반되는 기관지 카타르 3) 비인두염, 후두기관염 2. 수술시 호흡기 합병증의 예방과 치료
용법·용량	성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용하십시오.
사용상의 주의사항	1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약에 과민증 환자 2) 위·십이지장궤양 환자 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 1) 간장애 환자 2)심장애 환자 3)위·십이지장궤양의 병력이 있는 환자 3. 부작용 1) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 복부팽만감, 설사, 구갈, 위통, 드물게 위장관출혈, 가슴쓰림등이 나타날 수 있습니다. 2) 과민증 : 발진, 홍반등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오. 3) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진, 콧물, 전신압박감이 나타날 수 있습니다. 4. 임부에 대한 투여 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다. 5. 수유부에 대한 투여 : 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다. 6. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여하십시오.
포장단위	10, 30, 60, 100캡슐
저장방법	밀폐용기, 실온보관(1~30℃)
	※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 “소비자피해보상규정”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0401-02



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr