



새로운 처방의 고단위 잇몸질환 치료제

분류번호 231  
일반 의약품

# 덴탁스 캡슐

잇몸이란 말 그대로 이를 지탱해 주는 중요한 기능을 지니고 있습니다. 이러한 잇몸에 생기는 질환은 크게 치은염과 치주염(치조농루)이 있습니다. 치은염은 주로 잇몸 외부에 염증이 발생하는 것으로 잇몸이 붉게 부어오르고 칫솔질이나 딱딱한 음식을 먹을 때 출혈이 생기며 입 냄새도 심해지는 증상을 말합니다. 또한 치주염은 염증이 더욱 악화되어 치아의 뿌리까지 염증이 진행된 것으로 이가 흔들리고 시린 증상이 나타납니다. 결국은 이와 잇몸사이에서 고름이 흘러나오고 통증이 심해지면서 이가 빠지기까지도 하는 것입니다.

잇몸질환의 원인은 잇몸에 대한 직접적인 자극인 치석이나 치태, 입안의 세균, 기타 비타민 부족이나 내분비이상 또는 대사이상 등의 전신적인 원인에 의해서 발생하게 됩니다.

덴탁스 캡슐은 잇몸염증을 치료하는 염화리소짐과 카르바조크롬 및 잇몸출혈방지와 잇몸의 말초혈관 강화, 그리고 잇몸의 혈행을 증강시켜주는 2종의 비타민이 이상적으로 처방된 새로운 잇몸질환 치료제입니다.

## 【성분 · 함량】 1캡슐 중

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 염화리소짐(식약청고시)     | 30mg(역가)           |
| 아스코르빈산(K.P.)     | 150mg              |
| 50%초산토코페롤(식약청고시) | 10mg(초산토코페롤로서 5IU) |
| 카르바조크롬(식약청고시)    | 2mg                |

## 【약리 및 특징】

1. 덴탁스는 입안의 세균의 세포벽을 분해하여 직접적인 항균 작용을 나타낼 뿐 아니라 면역기능을 증강시켜서 세균을 녹이는 작용(면역용균작용)도 촉진시켜줌으로써 잇몸염증을 치료합니다.
2. 덴탁스는 항해파린 작용에 의한 직접적인 잇몸 출혈 억제 작용을 지닐 뿐 아니라 잇몸의 모세혈관을 강화시키고 투과성을 저하시켜 잇몸 출혈을 예방 치료합니다.
3. 덴탁스는 잇몸 염증으로 생긴 고름의 분해배출을 촉진하여 손상된 잇몸조직을 신속히 복구해 줍니다.
4. 덴탁스는 잇몸의 혈액 순환 촉진 및 항산화 효과를 통한 잇몸세포의 안정화작용 그리고 전신적인 내분비계 조정작용 등을 통해서 잇몸의 손상 방지작용을 나타냅니다.

## 【성상】

오렌지색 가루가 든 상부 중등색, 하부 황색의 불투명한 경질 캡슐제

## 【효능 · 효과】

치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화.

## 【용법 · 용량】

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

## 【포장단위】

90, 120, 240, 1000캡슐

## 【저장방법】

밀폐용기, 실온보관

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - 1) 약 및 화장품등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
  - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
  - 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2. 부작용
  - 1) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
  - 2) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
3. 일반적 주의
  - 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
  - 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
4. 저장상의 주의사항
  - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
  - 3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

※최신의 정보확인 방법 : 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 본사 소비자 상담실에서 확인할 수 있습니다.

\*본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환 하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환 하시기 바랍니다. (K-1)



제조발매원

## 진양제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 서초3동 1532-9 [T:(02)3470-0300]  
공장 : 경기도 안산시 단원구 초지동 649-3 [T:(031)494-8196]  
고객상담실 : (02)3470-0350 홈페이지 : www.jinyangpharm.com