마약성 진통제…

코노펜캅셀

마 약
전문의약품
분류번호:811

【원료약품 및 그 분량】

1캡셀 중

이부프로펜(약전)…… 200mg

아세트아미노펜(약전) …… 250mg

인산코데인(약전) …… 10mg

【성상】

백색의 과립 또는 분말이 충진되어 있는 상부 적색, 하부 백색의 경질 캅셀

【효능 · 효과】

염증 기인성 경증 및 중증도 통증의 완화

【용법 · 용량】

성인(13세 이상): 1회 1~2캡셀을 4시간 간격으로 복용, 1일 최대 12캡셀

【사용상의 주의사항】

1.경고

1)4주 이상 연속하여 투여하지 말 것.

2)매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.

2.다음 환자에는 투여하지 말 것.

1)중증의 간장애 환자 및 중증의 신장애 환자

2)소화성궤양 환자

3)지금까지 이 약에 의한 과민증상{예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)}을 일으킨 적이 있는 사람

4)지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

5)호흡예비력 저하 환자 및 기관지 천식 환자

6)만성 폐질환에 의한 원발성 심부전 환자

7)두부손상 및 두개내압 상승이 있는 환자

3.다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1)간장애 환자 및 신장애 환자

2)갑상선 기능저하증 환자 및 전립선 비대증 환자

3)부신피질기능저하증 환자

4)쇼크 환자

5)염증성 또는 폐색성 장질환 환자

4.부작용

1)과민증: 때때로 발진, 소양증, 혈관계 질환이 나타날 수 있으므로 그러한 증상이 나타나는 경우에는 신중히 투여를 중지할 것.

2)소화기: 때때로 소화불량, 위복부통, 위부 불쾌감, 구갈, 구토, 변비, 담관경련, 간기능장애 등이 나타날 수 있다.

3)정신신경계: 때때로 현기증, 이명, 우울, 불면, 기분변화 등이 나타날 수 있다.

4)심혈관계: 때때로 서맥, 진동, 기립성 저혈압, 내압상승 등이 나타날 수 있다.

5)비뇨생식기계: 드물게 뇨관 경련이 나타날 수 있다.

6)기타: 때때로 부종이 나타나는 일이 있다.

5.일반적 주의

1)환자의 상태를 충분히 고려하여 부작용 발현에 유의할 것.

2)고령자 및 소모성 질환자에는 부작용 발현에 주의하고 필요 최소한에만 그치는 등 신중히 투여할 것.

3)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

①이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

②고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
③천식이 나타난 경우
④황달 또는 전신의 부종, 혈뇨, 단백뇨 등의 증상이 나타난 경우

6.상호작용
1)다음 의약품의 작용을 증강시킬 수 있으므로 병용시에는 그 의약품을 감량하는 등 신중히 투여할 것.: 쿠마린계 항 혈액응고제, 마취제, 수면진정제, 페노티아진계 약물
2)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

7.임부 · 수유부에의 투여
임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신가능성이 있는 부인에게는 투여하지 말 것.

8.소아에의 투여
12세 미만의 소아에는 투여하지 말 것.

9.과량투여시의 처치
메스꺼움과 구토 증세를 수반함. 즉시 담당의사와 상의하거나 가까운 병원으로 갈 것.

10.보존 및 취급상의 주의
1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.
2)오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】
밀폐용기, 실온보관(1℃~30℃)

【포장단위】
자사포장단위

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※소비자 상담전화 : 080 - 577 - 8004(수신자 요금부담서비스)

작성년월 : 00.03.
개정년월 : 03. 5.(H02)

제조·판매원
하나제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 907-3