분류번호
325

일 반 의 약 품
KGMP적격업소

기미 · 주근깨치료제

시스틴500 연질캡슐

현대인은 과다한 칼로리, 지방, 술 등을 섭취하는 불균형한 식생활을 하고 있으며 정신적으로도 많은 스트레스를 받으며 생활하고 있습니다. 그 결과로서 간장 대사에 이상이 생겨 만성피로와 간염이 생기고 여드름, 기미, 주근깨, 정신적인 피로가 심하여 체질이 Allergy성으로 바뀌어져서 고생을 하게 됩니다.
시스틴500 연질캡슐은 녹용중에 약 20% 함유되어 있는 천연 아미노산 제제로서 생체기능에 생명활동력을 증강시키고, 환원형-SH기를 가지고 항염작용, 각질용해작용, 멜라닌생성 억제작용, 해독작용을 함으로써 여드름, 기미, 주근깨에 특유한 효과가 있으며 손상된 간장의 치료 및 예방에 우수한 효과를 지닌 제품입니다.

【원료약품 및 분량】 1캡슐(1520mg) 중

L-시스틴(EP) ····· 500mg
파라옥시안식향산메칠(약전) ····· 0.6mg
파라옥시안식향산프로필(약전) ····· 0.15mg

【성　　상】 유백색의 유상물질이 든 주황색의 장방형 연질캡슐

【효능 및 효과】
1. 전신권태
2. 약물에 의한 피부염
3. 기미, 주근깨, 햇볕에 탄데 등의 색소 침착증
4. 습진, 두드러기, 피부발진, 여드름
5. 손톱, 발톱이나 머리카락이 쉽게 갈라지는 등의 각질부위 질환의 치료 및 예방

【용법 · 용량】
1일 2~4캡슐(1000~2000mg)을 2~3개월 계속 복용하거나 한달 중 10~20일간 복용합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   중증 신기능 장애 및 간성 혼수
2. 시스틴뇨증인 경우는 신중히 투여 하십시오.
3. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 때때로 구역, 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   2) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
   3) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용시키십시오.
   (6세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.)
4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의 하십시오.
   1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관　　**【사용기한】** 제조일로부터 24개월

【포장단위】 90, 180, 150, 300Cap

본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
본 제품은 재정경제부고시 소비자피해보상규정에 의거, 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.
의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
소비자상담실(반품 및 교환처) 02-422-8422

개정일:2003.11
CYS 01

종이 분리배출

경기도 화성시 향남면 상신리 906-6
알앤피코리아(주)
주식회사 대웅제약 계열사