일 반 의 약 품

분류번호 : 114

초기감기 & 복합감기에

투윈콜 캅셀

TO • WIN • COLD

■ 성분 · 함량 : 1캅셀중

아세트아미노펜(약전)	200mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산클로페라스틴(제이.피.)	8mg
dl-염산메칠에페드린(약전)	8.75mg
무수카페인(약전)	20mg
세라티오펩티다제(식약청고시 제 98-127호) (6600 세라티오펩티다제 단위)	3.33mg
질산치아민(약전)	4mg
리보플라빈(약전)	2mg

■ 성 상

백색의 결정과 황색의 과립의 혼합물이 충진된 상단 미황색, 하단 백색의 경질캅셀제

■ 효능 · 효과

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■ 용법 · 용량

성인 : 1회 2캅셀, 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

어린이 8-14세 : 1회 1캅셀, 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

◎ 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

1. 다음 사람은 복용하지 마십시오
   1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
   2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
   2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 :발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증등)을 일으킨 적이 있는 사람
   3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영 • 유아 및 14 세 이하의 어린이
   4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
   5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
   6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.
   7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
   8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 용법 • 용량을 잘 지키십시오
   2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.
      진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
   3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오
   4) 3개월미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
   3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
      ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
      ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신 피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
      ③ 천식이 나타난 경우
   5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
   6) 장기 연용하지 마십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

■ **포장단위** : 12캅셀

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통 과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하여 드립니다.

인류를 건강하게—
경동제약주식회사
공장 : 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3
소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121

개정일 : 03. 2. S