일반의약품

동맥경화용제	
분류번호	218

고콜레스테롤혈증 및 말초혈행장애 예방 및 개선

리피클 연질캅셀

콜레스테롤은 세포막의 중요한 구성성분이며, 담즙산과 스테로이드 호르몬의 전구물질이 되는 필수지질로, 수용성이 아니므로 단백질과 결합한 형태로 혈장 중에서 운반되어 체내의 각 기관과 조직에서 사용됩니다. 성인의 경우 바람직한 수준의 혈장 총 콜레스테롤치는 200mg/dL 미만이며 240mg/dL 이상이면 고지혈증으로 진단됩니다.

고지혈증이란 지단백의 생합성 및 대사에 이상이 생겨 혈장 콜레스테롤이나 중성지방이 과도하게 증가된 상태를 말하며, 유전적인 원인에 의하거나 신증후군, 당뇨, 갑상선 증후군 등에 2차적으로 동반되어 나타나게 됩니다. 혈장내 콜레스테롤 수치가 정상범위보다 높으면 췌장염, 황색종, 신경질환 등을 야기할 수 있고 특히 주요 심장 및 혈관질환(협심증, 심근경색증, 심장돌연사, 뇌졸중)의 발병률과 밀접한 관련을 맺고 있다는 점에서 유의할 필요가 있습니다.

흔히 서구인에게 많이 발병하는 것으로 여겨진 고지혈증은 최근 우리나라에서도 식생활의 변화와 수명의 연장 등에 의해 증가하는 추세에 있으나, 콜레스테롤의 위험성에 대해서는 아직까지 홍보가 미흡하고 또 질환이 특별한 증상없이 진행되므로 그 유병인구에 비해 치료 및 예방이 적극적이지 못한 상태입니다. 고지혈증 환자가 적절한 치료를 받을 경우 동맥경화성 심질환의 위험도가 감소되는 것으로 알려져 있습니다.

리피클 연질캅셀은 복합성분의 지질대사 개선제로 콜레스테롤에 대해 합성 억제, 체내 이용 촉진, 소장에서의 흡수를 저해하는 상승적인 작용기전으로 혈장 콜레스테롤치를 매우 효과적으로 낮추며, 강력한 항산화작용을 나타내므로 산화작용에 의한 혈관벽 손상으로부터 시작되는 동맥경화 등의 심혈관계 성인병을 예방 및 개선합니다. 또한 말초혈행을 원활하게 하므로 고콜레스테롤 혈증에 수반되어 나타나는 손발저림, 수족냉증 등의 개선효과 역시 우수하며 특히 천연성분들로 구성되어 부작용이 거의 없습니다.

■ 원료약품의 분량 : 1캅셀 중

판테친(약전) ····· 62.5mg
(판테친으로서 50mg)
콩기름 불검화물(식품의약품안전청고시 제2000-14호) ····· 100mg
(천연 토코페롤로서 20mg, 식물스테롤로서 45mg)
비타민 E(유에스피) ····· 22.67 I.U.
(초산 d-α-토코페롤로서 16.67mg)
파라옥시안식향산메칠(약전) ····· 0.22mg
파라옥시안식향산프로필(약전) ····· 0.05mg

■ 성상

미황갈색의 유상물질이 든 주황색의 타원형 연질캅셀

■ 약리작용 및 특징

1. **리피클 연질캅셀**은 비타민 B_5(pantothenic acid)의 활성형인 판테친(pantethine)과, 대두에서 추출한 소이스테롤(soysterol), 강력한 항산화제인 초산토코페롤(tocopherol) 등 혈액을 맑게 해주는 성분으로 복합처방된 지질대사 개선제입니다.
2. 판테친은 콜레스테롤 생합성 과정 중의 효소를 저해하여 합성을 억제하고 지질 이용을 촉진하여 혈액 중의 여분의 콜레스테롤과 중성지방을 제거합니다. 또한 판테친은 지방대사를 비롯한 생체내 70개 이상의 효소반응에서 cofactor로 작용하는 Coenzyme A의 중요한 구성성분이므로 Coenzyme A의 생성을 증가시켜 신진대사를 전반적으로 활발히 해 줍니다.
3. 소이스테롤은 소장에서의 콜레스테롤의 흡수를 저해하고 배출을 촉진합니다.
4. 초산토코페롤은 강력한 항산화 비타민으로서 인체를 산화적 손상으로부터 방어합니다. 특히 동맥경화의 중요한 원인으로 생각되어지는 LDL-Cholesterol의 산화와 동맥 혈관벽의 산화에 의한 손상을 막아주므로 심혈관계 질환의 위험도를 낮출 수 있습니다. 그 외 성인에서 잘 발생하는 백내장, 당뇨합병증 및 암, 그리고 노화현상 역시 과다한 산화작용에 의한 현상으로 설명되어 질 수 있습니다.
5. **리피클 연질캅셀**은 천연성분들로 구성된 처방으로 부작용에 대한 우려없이 안심하고 복용할 수 있습니다.

■ 효능 · 효과

1. 고콜레스테롤 혈증의 개선
2. 고콜레스테롤 혈증에 수반되는 말초혈행장애(수족냉증 · 저림)의 완화

■ 용법 · 용량

통상 성인 1회 2캅셀, 1일 3회 식후 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 사용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   의사에게 치료를 받고 있는 사람
2. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
   2) 고콜레스테롤 혈증의 개선에는 식이요법이 중요하므로 본제를 복용하더라도 식이요법을 병행하십시오.
3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 이 약 복용에 의해 가려움, 발진 · 발적, 식욕부진, 하리(설사), 연변, 복통, 위부불쾌감, 구역, 가슴앓이, 오심 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   2) 이 약 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 많아질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선(고콜레스테롤치의 저하)이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

■ **포장단위** : 자사 포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서 작성년월일 : 2000. 08. 18
※ 설명서 개정년월일 : 2001. 02. 23

(주)에이치팜
경기도 화성시 향남면 상신리 902-3
http://www.hanwha-pharm.com
문의전화 : 080-729-5800

FM19092