

항히스타민제

히스타파정

Histafa Tab.

■ 성분 · 함량 1정 중

로라타딘(식약청고시 제2000-14호).....10mg

■ 성상

백색의 원형정제

■ 효능 및 효과

알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감), 만성 특발성 두드러기

■ 용법 및 용량

성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 10mg을 경구투여합니다.

6-12세 미만의 소아

- 체중 30kg이상 : 이 약으로서 1일 1회 10mg 투여합니다.

- 체중 30kg이하 : 이 약으로서 1일 1회 5mg 투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약에 과민증 환자 2) 6세 미만의 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

간장애 또는 신부전 환자

3. 부작용

이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고되었습니다. 그 밖에 탈모증, 아나필락시스, 간기능 장애, 상실성 부정맥 등이 나타납니다.

4. 일반적 주의

만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 4일 전에는 투여하지 않습니다.

5. 상호 작용

이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용 투여 시 이 약의 대사가 저해되어 혈중 농도가 높아집니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.

2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않습니다.

7. 과량투여시의 처치

과량을 투여했을 때에는 즉시 대증요법과 지지요법을 시작하여야 합니다.

환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 합니다.

(토관을 이용하는 방법이 우선적으로 사용됩니다.) 그러나 의식장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안됩니다. 구토 후에 활성탄과 물을 희석하여 투여할 수도 있습니다.

만일 구토가 성공적이지 못하거나 금기 사항일 경우는 위세척을 실시하여야 합니다.

이 약은 투석으로는 제거되지 않습니다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 합니다.

8. 보관상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 타 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

■ 저장방법 · 사용기간 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

2007.09.28