

진해·거담제

뮤코세린 캡슐

Mucoserin Cap.

뮤코세린은 비후성, 점조성 점액병변이 수반되는 호흡기 모든 질환에서 점액용해, 분비조절 및 점액섬모회 복원으로 호흡기 기능을 정상화하는 거담제입니다.

뮤코세린에 함유되어 있는 N-acetylcysteine은 USP수재 성분으로 탁월한 효력과 안전성이 공인되었습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(유·에스·피) 200mg

【성상】 백색의 분말이 충전된 상하 황색의 경질캡슐제

【약리작용 및 특징】

N-acetylcysteine중의 sulfhydryl group은 세포 산화물의 생성을 억제하여 세포독성을 방지하며 cysteine group은 간·폐세포의 보호작용을 하는 glutathione의 생합성에 이용됩니다.

- 점액 용해작용
응고된 객담의 S-S 결합을 S-H로 교환 처리하여 담 배출을 용이하게 하며 기침을 완화시킵니다.
- 분비 조절작용
점액의 분비운동력을 높이고 점도를 낮추어 계면 활성층을 보강합니다.
- 점막 기능 정상화
섬모운동을 촉진하고 기도 청정화로 점액-섬모계의 생리적 방어기능을 회복해 줍니다.

【효능·효과】

1. 주효능 효과
 - 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
 - 2) 인후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

【용법·용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환
 - 성인 : 1회 200mg 1일 3회
 - 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회, 2~5세 1회 100mg 1일 3회
2. 만성질환
 - 성인 : 1회 200mg 1일 2회
 - 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
3. 낭성섬유증
 - 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 위·십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오
신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다)
3. 부작용
 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용 투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 적응상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 2년

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

무수의약품제조관리기준
KGMP 적격인증업체

설명서 작성일 001201

설명서 개정일 050101