

붙이면 관절이 편안해집니다.

관절염, 근육통, 타박상, 뻘데

디디엘

첩부제

디클로페낙 디에칠암모늄 120mg

7매 / 일반의약품 / 분류번호:264

대화제약주식회사

이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1매 (8.56×5.94cm², 1.2g) 중

주성분 : 디클로페낙 디에칠암모늄(B.P)120mg

【성상】 얇은 노란색의 점착성 물질을 살색린트포에 도포하여 고체면에 박리지를 덮은 첩부제

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 진통, 소염

- 1) 변형성 관절염 2) 어깨관절 주위염 3) 건·건초염
- 4) 건주위염 5) 상완골상과염(테니스엘보우 등)
- 6) 외상후의 부기, 통증(타박, 타박상, 뻘) 7) 근육통

【용법·용량】 1일 1회 환부에 부착한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 대하여 과민증의 전력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 전식(비스테로이드성 소염진통제 등에 전식발작의 유발) 또는 그 전력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 기관지 천식 환자
 - 2) 이 약은 프로피렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 반응이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 피부 : 때때로 발적, 발진, 가려움증, 피부건조 및 자극감 또는 드물게 부기가 나타나는 수가 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다.
 - 2) 과민증 : 드물게 아나필락시안증상(두드러기, 호흡곤란 등)이 나타나는 경우가 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지한다.
4. 일반적인 주의
 - 1) 진통소염제에 의한 치료는 원인 요법이 아니라 대증요법이라는 점에 유의한다.
 - 2) 피부의 감염증에 불현성화할 우려가 있기 때문에 감염을 수반하는 염증에 대하여 사용할 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하여 관찰을 충분히 행하고 신중히 투여한다.
 - 3) 만성질환(변형성관절염 등)에 대하여 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하고, 또 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 주의한다.
5. 임부에 투여
 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대하여는 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피한다.

6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

7. 적응상의 주의

- 1) 눈 및 점막에 사용하지 않는다.
- 2) 표피가 결손되어 있는 경우에 사용하면 일시적으로 피부가 저리는 느낌이나 따끔거리는 것을 느낄 수 있으므로 사용시 주의한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 7매

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2006년 12월 13일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

※ / ~ : 2006년 12월 13일



분리배출



제조번호 :

사용기한 :



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정 : 경기도 화성시 황남면 상신리 907
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품