

【원료약품 및 그 분량】 1정중

아크리놀(약전)	25mg
차질산비스마스(약전)	75mg
침강탄산칼슘(약전)	100mg
〈칼슘으로서 40.04mg〉	
황련가루(약전)	50mg
〈베르베린(염화베르베린)으로서 2.1mg〉	
스코폴리아엑스(약전)	5mg
〈총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)로서 45.0 μ g〉	

【성 상】

황갈색의 원형 정제

【효능·효과】

설사, 복통을 수반하는 설사, 식제, 묽은변, 토사

【용법·용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 식후 복용함

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부, 신생아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 발열을 수반하는 설사환자, 고령자, 혈변환자 또는 점액변이 계속되는 환자
3) 위·십이지장 궤양 등이 있는 환자
4) 소아
5) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 부작용
1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사, 또는 의사와 상의한다.
2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 투여시에는 음주하지 않는다.
3) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4) 3일 이상 계속하여 투여하지 않는다.
- 상호작용
위장진통, 진경제와 병용 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여
이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위



원진제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담실 031)494-3646

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.