일반의약품

분류번호 : 141

알레르기 · 비염치료제

알지렉스정

(염산 세티리진)

우수의약품 KGMP 적격업체 제품

우리의 몸은 외부에서 들어오는 이물질에 맞서 저항할 수 있는 면역기능이 있는데 이 이물질에 따라 특이한 체질을 가진 사람은 면역반응이 과민하게 나타나서 콧물, 재채기, 기관지천식, 가려움증등 심한 증상이 나타납니다. 이러한 증상을 알레르기증상이라고 하며, 알레르기증상의 원인물질로는 집먼지 진드기가 가장 많고 그외 꽃가루, 곰팡이, 애완동물의 털, 비듬, 세제, 약물등이 있으며, 최근에는 아파트생활등 주거환경의 변화와 스트레스 그리고 각종공해 특히 자동차배기가스, 황사, 외국에서 유입되는 신소재등 많은 이물질이 원인이 되어 환자 수가 크게 증가하고 있습니다.

알지렉스정은 유럽에서 가장 많이 팔리고 있는 "염산세티리진"제제로, 복용후 졸리움등의 부작용이 없이 항히스타민 효과를 발휘할뿐 아니라 혈액내에 알레르기를 일으키는 세포를 안정시켜 알레르기 발생을 근원적으로 억제하여 알레르기를 치료하는 전혀 새로운 약물입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중

염산 세티리진(식약청고시 제98-127호) ·····10밀리그람

【성 상】

백색의 장방형 필름 제피정

【약리작용 및 특징】

1)졸음이나 진정작용이 없으므로 정신을 집중하는 일에 종사하는 분이나 운전하시는 분이 복용하기에 적당한 약물입니다.

2)6세이상의 어린이나 노인들이 성인 용량을 복용하여도 복용량 과다로 인한 부작용이 전혀 없습니다.

3)복용후 20분이면 효과가 나타나고 그 효과는 24시간 지속하므로 하루 한알로 충분한 효과를 기대할 수 있습니다.

【효능 · 효과】

1. 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부 소양증
2. 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염

【용법 · 용량】

성인 및 6세 이상의 소아: 염산세티리진으로서 1일 1회 10mg 취침전에 경구 투여한다. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 분할 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1)이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
   2)신부전 환자
   3)임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   4)6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1)신장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
   2)간장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
   3)고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
3. 이상반응
   1)정신신경계: 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중, 흥분이 나타날 수 있다.
   2)소화기계: 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상이 나타날 수 있다.

3)순환기계: 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
4)혈액: 맥관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 림프구증가, 호산구증가, 드물게 단구증가, 혈소판증가가 나타날 수 있다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
5)과민증: 광과민증, 아나필락시스 쇽, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있다.
6)눈: 드물게 흐린시력, 결막충혈이 나타날 수 있다.
7)간: 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GPT, LDH의 상승 등 간기능장애(초기증상: 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등) 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
8)신장: 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있다.
9)기타: 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의
건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 이상반응도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않는다.

5. 상호작용
다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1)동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.
2)이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여
6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 한다.

9. 과량투여시의 처치
과량투여시의 증상은 진정이다. 이 경우 위세척을 실시한다.

10. 임상검사치에의 영향
이 약은 알레르기항원 피내반응을 억제하므로 알레르기항원 피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.

11. 저장상의 주의사항
1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

12. 기타
증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, · 사용기간: 3년

【포장단위】 자사포장단위

원진제약(주)
경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
소비자상담실: 031)494-3646

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서 작성일자(2004년 1월 28일)이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.