

진경제 · 위장기능정상화제

티로민^정

(염산 티로프라미드)

티로민은 인체에 무해한 천연아미노산을 근간으로 하는 분자구조를 가진 염산티로프라미드제제로서, 평활근세포내 아데닐사이클라제(Adenylcyclase)를 활성화하여 c-AMP의 양을 증가시킴으로써 위장관자극에 의한 과잉수축 및 운동이상증, 복부통증, 설사, 변비, 과민성대장증후군 등의 증상을 신속히 정상화시키는 우수한 진경제입니다.

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중,

염산티로프라미드(별규) 100mg

■ 성 상 백색의 원형필름 코팅정

■ 약리작용

1. 신속한 효과

티로민은 평활근세포내 아데닐사이클라제(Adenylcyclase)를 활성화시켜 c-AMP의 양을 증가시킴으로써 각종 평활근의 과도수축에 의한 경련성통증을 신속히 정상화시킵니다.

2. 위장관운동을 정상적으로 유지

티로민은 근세포내의 근질내세망(칼슘저장소)에 과잉의 Ca²⁺을 저장하였다가 생리적인 자극이 있을때 세포 내로 다시 방출함으로써 위장관운동을 정상적으로 유지시킵니다.

3. 부작용이 없는 안전한 약물

티로민은 인체에 무해한 천연아미노산을 근간으로 하는 분자구조를 지닌 염산티로프라미드제제로, 종래의 진경제가 자율신경계의 신경전달물질인 아세틸콜린의 작용을 차단함으로써 많은 부작용을 유발시킨데 비해, 위장관 평활근에만 작용하므로 항콜린작용에 의한 부작용의 염려없이 보다 안전하게 사용할 수 있는 약물입니다.

■ 효능 · 효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장 · 요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부경련 및 통증 : 위장관이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

■ 용법 · 용량

성인 : 염산티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 외부자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
- 2) 거대결장, 허탈한환자
- 3) 이 약에 과민증 환자
- 4) 중증의 간부전환자

2. 다음의 경우에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.

4. 상호작용

혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.

■ 저장방법 · 사용기한

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■ 포장단위 30, 100, 500, 1000정

■ 제조 · 판매원 한울제약주식회사

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 최신 허가 변경 사항은 자사의 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하여 주시기 바랍니다.

TRM-I-3
07-03-06

HANALL 
pharmaceutical

서울시 송파구 신천동 11-10 잠실 I-SPACE B/D 6F
공 장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1
고객지원팀 : 1644-5515 www.hanall.co.kr