

정 아세피필린 250mg

Acepifyline 250mg Tab

전문의약품

분류번호: 229

【원료약품의 분량】 1정(300mg) 중

아세피필린(안전분부고시 96-2호, 주보 1)250mg

【성 상】 백색의 원형 정제

【효능·효과】

다음 질환의 기도 폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러증상의 완화 - 만성기관지염, 기관지천식

【용법·용량】

성인 : 아세피필린으로서 1회 250 ~ 500mg, 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 크산틴계 약물에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.

- 1) 심장대 및 관상순환부전 환자
- 2) 비만환자
- 3) 간질의 병력이 있는 환자
- 4) 위.십이지장 궤양 환자
- 5) 감상선기능항진증 환자
- 6) 급성 신염 환자

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 빈맥, 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 두통, 어지러움, 졸음, 불면, 흥분, 불안 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 단백뇨 등이 나타날 수 있다.
- 5) 과량투여 : 두통, 어지러움, 구역, 혈압강하, 경련, 헛소리, 혼수를 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

테오필린의 경우 대표적인 부작용으로 소화기 증상(특히 구역, 구토) 및 정신신경증상(두통, 불면, 불안, 흥분, 경련 등)이 나타날 수 있고 이러한 부작용은 대부분 혈중 농도의 상승에 의한 것으로 알려져 있으므로 이 약의 투여시에는 혈중농도의 모니터를 적절히 하고 환자 개개인에 적합한 투여 계획을 설정하는 것이 바람직하다.

5. 상호작용

- 1) 다른 크산틴계 약물 또는 중추신경 흥분제와 병용하면 과도의 중추신경자극작용이 나타나므로 이러한 약과 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 바르비탈계 약물, 페니토인과 병용투여시 또는 흡연 환자에게 이 약을 투여시 이 약의 혈중농도를 감소시킬 수 있다.
- 3) 에리스로마이신, 올레안도마이신, 린코마이신, 시메티딘, 알로푸리놀, 퀴놀론계 약물과 병용투여시 이 약의 혈중농도를 증가시킬 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

이 약이 태아에 영향을 미친다는 보고는 없으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여

이 약은 모유로 분비되어 영아에게 빈맥 등이 나타날 수 있으므로 수유중에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 이 약을 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】 차광된 밀폐용기, 실온보관, 제조일로부터 36개월

* 본 제품은 "우수의약품 제조관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

* 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.

* 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 ☎031-319-1990으로 문의하십시오.

* 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.

※ 개정년월 : 2000. 07



제 조 판 매 원

동인당제약주식회사

경기도 서울특별시 동대문구 1246-8(시화공단 1차-603호)

www.dongin-dang.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체