

휴온스 염산피리독신 주사액

분류번호 : 313

■ 원료약품의 분량 1mL 중

염산피리독신(약전) 50mg

■ 성 상

무색~미황색의 액이 들어 있는 갈색 앰플 주사제

■ 효능·효과

1. 비타민 B₆ 결핍증의 예방 및 치료
약물투여(예: 이소니아지드, 하이드랄라진, 피라진아미드, 페니실라민)로 인한 경우 포함
2. 비타민 B₆의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취가 불충분할 경우
소모성 질환, 임부·수유부, 에스트로겐제제(예: 경구피임제) 복용자 등
3. 비타민 B₆ 의존증
비타민 B₆ 반응성 빈혈 등
4. 다음 질환 중 비타민 B₆의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 구각염, 구순염, 구내염, 설염
 - 2) 급·만성 습진, 지루성 습진, 접촉성 피부염
 - 3) 말초신경염
 - 4) 방사선장해(숙취, 宿醉)

■ 용법·용량

경구복용이 불가능할 경우

○ 성인 : 염산피리독신으로서 1일 10~100mg을 1~2회 분할하여 근육, 피하 또는

정맥주사 한다.

- 비타민 B₆ 의존증인 경우에는 고용량을 투여할 수 있다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플 주사제는 용기절단 시, 유리파편이 혼입되어 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용 시, 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단, 사용하되 특히 어린이, 노약자에 사용 시는 각별히 주의한다.

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 레보도파를 투여 받고 있는 환자

3. 이상반응

- 1) 광선과민증이 나타날 수 있다.
- 2) 구역, 두통, 졸음이 나타날 수 있다.
- 3) 고용량으로 장기 복용할 경우(수개월에 걸쳐 1일 2g 이상 복용) 신경경련, 수족마비, 운동실조를 동반한 감각신경증이 나타날 수 있다. 복용을 중단할 경우 증상은 개선되나, 정상으로 회복될 때까지 6개월 정도 소요될 수 있다.
- 4) 주사 시 불쾌감, 동통이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 비타민 B₆ 의존증에 고용량을 투여하는 경우에는 충분한 관찰을 필요로 한다. 특히 신생아, 영아에게 투여 시는 소량에서부터 서서히 증량하여 증상에 적합한 양에 도달하도록 한다.
- 2) 고용량 투여 후 일시적인 의존성이 나타날 수 있으므로 서서히 감량하여 중단하는 것이 필요하다.
- 3) 비타민 B₆의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우에 한하여

효과가 없는 경우 1개월 이상 사용하지 않는다.

5. 상호작용

- 1) 이 약은 레보도파의 말초대사를 증가시켜 효과를 감소시킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
 - 2) 이소니아지드, 페니실라민, 에스트로겐 제제(예: 경구피임제)는 비타민 B₆의 요구량을 증가시킨다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
임부의 고용량 복용은 신생아, 유아에서 비타민 B₆ 의존성 증후군과의 관련성이 보고된 바 있다.
7. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 차광하여 실온에 보관한다.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

작성일 : 2006.05.17

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인할 수 있습니다.