

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

건조수산화알루미늄겔(약전).....160mg

탄산마그네슘(약전).....105mg

■ 성 상 : 백색의 원형정제

■ 효능·효과

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감,

식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

■ 용법·용량 : 성인 1일 3회, 1회 4정씩 식후 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장장애 환자.

2) 다른 약물을 투여 받고 있는 사람.

2. 부작용

이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것.

2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

3) 장기 연용하지 않는다.

4) 신장병의 병력이 있는 환자에는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

미니시드 정

1,000정



제조판매원

동인당제약주식회사

경기도 시흥시 정왕동 1248-8(시화공단1라603호)
www.dongin-dang.co.kr

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체

4. 금기-투석요법을 받고 있는 환자

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관한다.

3) 오용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 및 사용기간 기밀용기, 제조일로부터 36개월

■ 개정년월일 2003. 05.

※본 제품은 "우수의약품 제조관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.

※본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.

※본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자상담실 ☎ 031-319-1990으로 문의하십시오.

※올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :



분리배출