

■ 원료약품의 분량 : 1정중

브로멜라인 (20,000IU)(식약청고시 98-127호).....40mg

겔정성트립신 (2,500IU)(USP).....1.0mg

■ 성상 : 백색의 원형 장용성 필름 코팅정

■ 효능·효과 :

다음 질환 및 증상의 염증성 부종의 완화 :

수술 및 외상, 유즙울체

■ 용법·용량

성인: 첫날 1회 2정, 1일 4회 이후 유지량으로

1회 1정, 1일 4회 복용한다.

체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이

많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로

목적 없이 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에

의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1)혈액응고이상 환자

2)심한 간장애 또는 신장애 환자

3)임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

(임신 중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있

지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을

상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

트립라인 정

100정

제조판매원
동인당제약주식회사
경기도 서울시 청량동 1245-9(시화공단1차503호)
www.dongin-dang.co.kr무수약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

4)항응고제를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항응고제의

작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히하고 신중히 투여한다)

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과

의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

1)과민반응: 발진, 발적 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이

나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2)소화기계: 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역,

구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3)혈액계: 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항: 정해진 용법·용량을 지킬 것.

4. 저장상의 주의사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2)의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은

의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이

될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법

차광된 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관.

개정년월: 2005. 7.

제조번호 :

사용기한 :



분리배출