위장관기능 조절제

메 부 라 틴 정

Trimebutine Maleate

전문의약품
분류번호239

■ 성분 · 함량 : 1정(220밀리그람)중

말레인산트리메부틴(식품의약품안전청고시제98-127호) 100밀리그람

■ 성상 : 백색의 원형정제

■ 효능 · 효과

1. 주효능 · 효과
   1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
   2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
   3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

■ 용법 · 용량

성인 : 밀레인산트리메부틴으로서 1회 100~200밀리그람 1일 3회 식전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수가 있다.
   2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
   3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
   5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
3. 수유부에 대한 투여
   수유부의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중단한다.

■ 저장방법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준)에 의하여 엄격한 품질관리하에 제조하였으나 유통과정중에 변질 또는 파손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

약은 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

제조발매원
주식회사 넥스팜코리아
본사 : 서울특별시 서초구 서초동 1448-4 ☎ 02-3473-6365
공장 : 충북 진천군 문백면 장월리 112-3 ☎ 043-534-4394

KGMP
적격업체제품

소화기능 조절제

메부라틴정

Trimebutine maleate 100mg

- 1000 Tabs-

■ **성분 · 함량** 1정(220 mg)중

말레인산트리메부틴(식품의약품 안정청고시 제98-127호) ····· 100mg

■ **성 상 :** 백색의 원형정제

■ **효능 · 효과**

1.주효능 · 효과

1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)

2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장

3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면 장애

■ **용법 · 용량**

성인 : 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

HDPE
분리배출

제조판매원
주식회사 넥스팜코리아
충북 진천군 문백면 장월리 112-3

전문의약품

분류번호:239

MEBURATINE

KGMP

적격업체

MEBURATINE Tab

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용

1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.

2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.

3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.

4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으르모 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

■ **저장방법** : 기밀용기에 넣어 실온 (1~30℃)에 보관하십시오.

■ **사용기간** : 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** : 자사포장단위

제조번호 :

사용기한 :

8 809120 900914