넥스팜 **염산암부록솔** 정
(Ambroxol HCl)

일반의약품
분류번호222

■ **개요 및 특징**

넥스팜염산암부록솔정은 표면 활성 물질(Surfactant)의 생성을 촉진시켜 주는 작용과 아울러 이비인후 • 호흡기계의 정도 높은 끈끈한 축적 분비물을 배출 • 제거하는 분비물을 용해작용과 점액분비 촉진작용을 겸비하고 있다.
따라서 **넥스팜염산암부록솔정**은 점액의 배출을 촉진하고 호흡을 용이하게 한다.
이비인후 • 호흡기계 점막의 분비 조절기능은 **넥스팜염산암부록솔정** 치료기간동안에 정상화되며 거담, 기침 등의 개선을 가져온다. 또한 **넥스팜염산암부록솔정**은 호흡기계의 정막에 보호피막을 형성하는 표면활성물(Surfactant)의 분비를 촉진하여 호흡기계통의 자체 보호 기능을 해주며 급 • 만성 이비인후 • 호흡기 질환에 유효하다.

■ **성분 • 함량** : 1정중

염산암부록솔(식품의약품안전청고시 제98-127호) ····· 30 mg

■ **성 상** : 백색의 원형정제

■ **효능 • 효과**

1. 주효능 • 효과
점액분비 장애로 인한 급 • 만성 호흡기 질환 : 급 • 만성기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성비염

■ **용법 • 용량**

성인 : 염산암부록솔로서 1회 30밀리그람 1일 3회 경구투여한다.
계속 치료시 1회 30밀리그람 1일 2회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
중증 신장애 환자
3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 위부불괘감, 위 • 복부팽만감, 위 • 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림,식욕부진 등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수있다. 극히 드물게 염부록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성아나필락시스양반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
3) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
4. 상호작용
에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증감시킬 수 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
임산중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다 (특히 임신초기 3개월이내에는 투여하지 않는다).
6. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■ **저장방법** : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■ **사용기간** : 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** : 자사포장단위

※ 본의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기간이 경과하였거나 유통과정중 변질, 변폐 또는 오손된 제품이발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (02)3473-6365로하시기 바랍니다.

약은 어린아이의 손이 닿지않는 곳에 보관하여야 합니다.

제조판매원
주식회사 **넥스팜코리아**
본 사 : 서울특별시 서초구 서초동 1448-4 ☎ 02-3473-6365
공 장 : 충북 진천군 문백면 장월리 112-3 ☎ 043-534-4393

KGMP
적격업체제품