비스테로이드성 소염 · 진통제

탈루메이드 정

Talniflumate Tab

전문의약품
분류번호114

탈루메이트정은 새로운 비스테로이드성 소염, 진통제로서 염증 진행과정에 있어 각종 기염, 통증 전달물질(PGE, PGF)의 형성을 차단하여 류마티양 관절염, 골관절염, 좌골신경통, 염좌, 건초염, 무월경성동통, 인두염, 편도염 등에 효과적인 치료를 나타날 뿐 아니라, 기존 NSAID의 위장장애와 같은 부작용이 극소화된 보다 개선된 제제입니다.

■ 성분 · 함량 : 1정(650밀리그람)중

탈니플루메이트(식품의약품안전청고시제98-54호) 370mg

■ 성상 : 백색의 원형필름코팅정제

■ 효능 · 효과

1. 다음질환에 사용할수 있다.
   류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성관절질환), 좌골신경통, 무월경성동통, 외상후동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편두염, 이염, 부비동염

■ 용법 · 용량

성인 : 탈니플루메이트로서 1회 1정씩(370밀리그람) 1일 3회 경구투여 한다.
중증일 경우에는 1회 2정(740밀리그람)을 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 간장애 환자　　2) 신장애 환자
3. 부작용
   1) 과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있다.
   2) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대중요법에 유의한다.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
      (2) 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음사항을 고려한다.
      (1) 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      (2) 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
      (3) 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6) 다른 소염진통제와 병용투여는 피하는 것이 바람직하다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
5. 상호작용
   쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
6. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
   1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
   2) 어린이에 대한 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세 이하의 어린이에는 투여하지 않는다.

■ 사저장방법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한 경과 하였거나 유통과정중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
제품에 관한 문의는 전화(02)3473-6365)로 하시기 바랍니다.

약은 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

제조발매원
주식회사 넥스팜코리아
본사 : 서울특별시 서초구 서초동 1448-4 ☎ 02-3473-6365
공장 : 충북 진천군 문백면 장월리 112-3 ☎ 043-534-4394

KGMP
적격업체제품