KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품 제조지정업체
KGMP

일반의약품
분류번호 : 141

THE MOST SAFE&EFFICIENT

삐삐콜플러스정

Pbipbicol plus Tabs.

삐삐콜플러스정은 brompheniramine의 이성체 중에서 확실한 약효를 가진 dexbrompheniramine만을 분리하므로써 부작용을 사전에 예방하고 약물의 효율성을 높인 광학활성의약품입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

말레인산덱스브롬페니라민(유.에스.피) ····· 2mg
황산슈도에페드린(유.에스.피) ····· 60mg

【성　　상】

하늘색의 장방형 정제

【특　　장】

1. 삐삐콜플러스정에는 콧물, 재채기, 코막힘에 효과적인 항히스타민제와 비충혈완화제가 들어있어 다양한 비염증상을 치료해 줍니다.
2. 삐삐콜플러스정에 들어있는 dexbrompheniramine은 가장 활발한 항히스타민작용을 가지고 진정작용이 매우 적은 alkylamine 계에 속합니다.
3. 삐삐콜플러스정에 들어있는 pseudoephedrine은 감기, 알레르기, 고초열(비염)에의한 부비동염, 코막힘 등에 쓰이며 지속적인 약효를 발휘합니다.

【효능 · 효과】

계절성 및 통년성 비 알레르기, 급성비염 및 부비동염, 급성 및 아급성 부비강염, 이관폐색 및 분비성 중이염에서의 상기도 점막 충혈의 증상 변화

【용법 · 용량】

성인 및 12세 이상의 소아: 1일 3~4회, 1회 1정씩 식후복용
6세~12세 미만의 소아: 1일 3~4회, 1회 1/2정씩 식후복용

【사용상의 주의사항】

1.금기환자
1) 선행하는 2주에서 MAO 억제약물을 복용한 환자 혹은 복용중인 환자
2) 혈압상승 효과가 있는 amines 혹은 항히스타민제에 대해 과민반응이 알려져 있는 환자

2. 주의사항
1) Pseudoephedrine은 정상혈압을 나타내는 사람에게는 실제적으로 어떠한 혈압상승효과도 유발하지 않으나, 노인환자와 고혈압, 만성폐질환, 당뇨병, 잠복성 혹은 임상적으로 인식되는 폐쇄각 녹내장, 관상동맥질환, 울혈성심부전, 요폐, 전립선비대증 및갑상선기능항진증을 지니고 있는 환자에 대하여는 신중히 투여하여야 합니다.

2) Dexbrompheniramine은 졸음을 유발하여, 민첩성을 요하는 업무수행 혹은 운전능력등에 손상을 일으킬 수 있습니다.

3) 항히스타민제의 억제효과는 중추신경계에 영향을 나타내는 다른 약물과의 병용투여시 부가적으로 나타날 수 있으므로 항히스타민제 치료요법을 실시하고 있는 동안, 알코올성 음료를 음용하거나 수면제, 진정제, 정신치료약물 혹은 중추신경계 억제 효과가 있는 기타 약물을 복용하고 있는 환자에 대해 주의가 요구됩니다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신 및 수유기간 동안 이 약의 안전한 사용에 대해서는 아직 명확히 수립되지 않았으므로 투여 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 부작용

1) 때때로 경증의 졸음 및 피부발적이 나타날 수 있습니다.

2) 불안, 긴장, 안절부절증, 신경과민증, 진전, 허약, 불면증, 두통, 심계항진, 빈맥, 협심증,혈압 상승, 발한, 동공산대, 식욕부진, 오심, 구토, 현기증, 변비 및 방광괄약근 경련으로인한 배뇨 곤란이 나타날 수 있습니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1～30℃)보관, 제조일로부터 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

종이
분리배출

개정년월일: 010615