



비충혈 제거제

전문의약품

분류번호: 222

신일 슈도에페드린정

염산슈도에페드린

신일슈도에페드린정은 호흡기 점막의 α -수용체에 대한 직접적인 흥분 작용으로 혈관을 수축시켜 감기, 부비강염으로 인한 비충혈을 제거하고, β -수용체에 작용하여 기관지를 확장시켜 기침으로 인한 호흡곤란을 완화시켜줍니다. 또한 항히스타민제와 병용시 상승작용을 나타내어 콧물, 코막힘, 재채기 등의 증상완화에 효과적입니다.

【성분·함량】 (1정 중)

염산슈도에페드린(Pseudoephedrine HCl)(유.에스.피.) 60mg

【성상】

백색의 원형 정제

【효능·효과】

다음 질환에 의한 비충혈: 감기, 부비강염, 알레르기 등 상기도질환

【용법·용량】

• 성인:

염산슈도에페드린으로서 1회 30~60mg(1/2~1정), 1일 3~4회 경구투여하십시오.
1일 최대투여량은 240mg입니다.

• 소아:

- 1) 6~11세: 1회 30mg
2~5세: 1회 15mg
1일 3~4회 투여하십시오.
1일 총 투여횟수는 4회를 초과하지 않습니다.
- 2) 6개월 ~ 1세: 1회 15mg, 1일 2회 투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 교감신경흥분성 아민류에 과민증 환자
- 2) 심한 고혈압 환자
- 3) 심한 관동맥질환 환자
- 4) 갑상선기능항진증 환자
- 5) 당뇨병 환자
- 6) 수유부
- 7) MAO저해제를 투여중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 전립선비대증 환자
- 2) 고혈압 등 심혈관 질환 환자
- 3) 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자
- 4) 안내압상승 환자
- 5) 심한 간·신부전 환자

3. 부작용

- 1) 순환기계: 심계항진, 빈맥, 부정맥, 안면창백, 저혈압을 수반한 심혈관허탈이 나타날 수 있습니다.
- 2) 정신신경계: 편두통, 두통, 어지러움, 불안, 긴장, 무력감, 허약, 불면, 환각, 경련, 중추신경계 흥분 또는 억제 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계: 변비, 구역, 소화 장애 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 과민증: 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 5) 비뇨기계: 때때로 요저류가 나타날 수 있습니다.
- 6) 기타: 구갈, 발한 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

7일 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 고열이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 교감신경흥분약과 병용할 경우 이 약의 작용이 증강될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.
- 2) 클로로포름, 시클로프로판, 할로탄 등 할로겐화 마취제와 병용할 경우 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용 투여하지 않습니다.
- 3) 고혈압약, 삼환계 항우울약 등과 병용 투여시에는 혈압을 관찰하면서 신중히 투여하십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단하십시오.

7. 소아에 대한 투여

2세 미만의 영아는 약사 또는 의사의 지시에 따라 투여하십시오.

8. 고령자에 대한 투여

고령자는 특히 이 약에 의한 부작용이 나타나기 쉽고 과량 투여시 환각, 경련, 중추신경계 억제 및 사망을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 3년

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

