

제니드정

제니드정은 라니티딘과 세가지의 이상적인 제산제가 복합처방된 새로운 위장약입니다. 제니드정 중 라니티딘은 최근에 개발된 H₂ 수용체 길항제로서 신속하고 지속적인 위산분비 억제작용을 나타내고 세가지의 제산제는 안정적인 구조를 가지고 위점막 보호작용과 제산작용으로 위통, 속쓰림, 위부팽만감, 구역, 소화불량을 신속히 치료해 줍니다.

【원료약품의 분량】 1정중

염산라니티딘(KP)	31.5mg
총 산화마그네슘(KP)	50.0mg
규산알루미늄산마그네슘(KPC)	125.0mg
수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	100.0mg
【총 산화알루미늄(Al ₂ O ₃)으로서 63.31mg, 총 산화마그네슘(MgO)으로서 110.13mg】	
황색4호(타르색소 고시)	0.04mg

【성 상】 황색의 원형 필름코팅정

【효능 및 효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법 및 용량】 성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되, 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용한다.
단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자

혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.)

2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자

스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소등이 나타날 수 있다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.)

3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가 될 수 있다.)

4) 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람

5) 소아(15세미만) 및 고령자(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다.) 80세 이상의 고령자에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있다.

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임신에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의할 것.

7) 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.

2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람

3) 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다.

4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소

등의 혈액이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 본제의 부작용을 은폐시킬 수 있다.

5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.

3. 이상반응

본제의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것.

- 1) 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있다.)
- 2) 본제의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고, 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉬게 됨(치강의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상 의할 것.
- 2) 2주간을 초과하여 연용하지 말 것.
- 3) 본제를 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 말 것.(혈중알콜농도를 높일 수 있음.)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 말 것.
- 6) 장기 연용을 하지 않는다.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 상호작용

- 1) 본제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다.
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
 - 뉴키놀론계 항균제(오픈록사신 등)
- 2) 본제를 다른 위장약과 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.

7. 소아에 대한 투여 - 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)

8. 고령자에 대한 투여(65세 이상) - 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것
 - 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것
10. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것 - 이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

【자사포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 <http://www.anampharm.com>과 (Tel : 053-856-7711) 에서 확인할 수 있음