KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 219

혈전색전질환 예방 및 치료제

트리스 캅셀
Tris Cap.
(트 리 플 루 살)

트리스캅셀은 혈소판 Cyclooxygenase의 선택적 억제 및 c-AMP 농도증가의 이중적인 기전을 통해 혈소판응집억제작용, 항혈전작용, 혈관확장작용 및 혈액유동학적 성질 개선작용을 나타내어 뇌혈관장애, 협심증, 동맥경화증, 수술 후 혈전증, 당뇨병성 말초혈관질환 등에 우수한 임상효과를 나타냅니다.
트리스캅셀은 기존의 항혈소판제제에서 빈발하는 혈액계 부작용, 위장장애, 출혈위험 등의 부작용이 거의 없어 안전하게 사용할 수 있는 약물입니다.

【원료약품 및 그 분량】
1캅셀 중
트리플루살(EP) ····· 300mg

【성　　상】
백색 또는 거의 백색의 가루가 든 상, 하부 무색투명의 경질캅셀제

【효능 · 효과】
혈전증에 의한 합병증을 포함한 혈전색전질환 예방과 치료 및 혈소판 응집억제
주적응증
- 일과성 허혈에 의한 뇌혈관장애 또는 가역적 불완전 신경결핍을 나타내는 뇌혈관장애의 예방 및 증상개선
- 불안정 협심증으로 인한 급성 심근경색의 예방
- 동맥경화성 기능장애의 예방
- 외과수술 후 심부정맥 혈전증 및 폐색전증의 예방
- 혈관 수술 후 혈전증

【용법 · 용량】
성인 1일 1~3캅셀(트리플루살로서 300~900mg)을 식사중 또는 식후에 분할 투여한다.
단, 연령 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 임신부
   2) 소화성 궤양의 기왕력이 있는 환자

3) 살리실산 유도체에 과민성이 있는 환자

2. 부작용

과민한 환자에서 위통, 연하곤란, 속쓰림, 소화불량, 구역 등의 위부불쾌감이 나타날 수 있으나 식사와 함께 복용하거나 제산제를 투여하면 증상이 경감됩니다. 드물게 소화성 출혈, 멜레나, 결막출혈, 반상출혈, 청각장애, 편두통이 나타날 수 있다.

3. 상호작용

1) 항응고제요법을 받고 있는 환자에게 이 약을 투여하면 항응고제의 효력을 증가시킬 수 있으므로 주의하여 투여해야 한다.

2) 이 약은 경구용 혈당강하제의 작용을 증강시킬 수 있으므로 병용투여시에는 혈당강하제의 용량을 감량해야 한다.

4. 임부에 대한 투여

이 약의 기형발생에 대한 영향의 증거는 없지만 임신 또는 임신가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.

5. 과량투여시의 처치

1) 과량복용시에만 나타나는 우발적인 중독사고의 경우, 중추신경계의 흥분 또는 억제증상, 심장순환기계 및 호흡기계의 변화, 소화성 출혈 및 설사 등과 함께 전해질 평형의 변화가 나타날 수 있다.

2) 중독이 일어난 경우 활성탄 수성현탁액을 투여하거나 위세척을 실시하고 전해질 평형을 유지하며 대증요법을 실시한다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

100캅셀

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎ 02-6207-6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 이 의약품 첨부문서 개정년월일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에 명시되어 있으며, 또한 본사로 문의하실 수 있습니다.

작성년월일 : 2000. 5. 30
개정년월일 : 2001. 8. 7

P2980108

제조발매원
(株) 柳英製藥
충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17