

[사용상의 주의사항]

1. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2)지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람 3)간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 4)심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자 5)임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부 6)의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

1)용법·용량을 잘 지켜십시오.
2)다음 약물과 동시에 복용하지 마십시오. (다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등)
3)소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도, 감독하에 복용 시키십시오.
4)7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시키십시오.
5)3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고, 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는게 좋습니다.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

1)복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 2)복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오. 3)수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의

1)소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
2)직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3)오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.



제조판매원

유한양행

본 사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공 장 : 충북 청원군 오창면 양창리 807-1

한외마약



500mL

진해·거담제

코푸시럽

분류번호 : 222
(진해거담제)

Cough syrup

유한양행

[성분·함량] 100mL 중

주석산디히드로코데인(비피) 50mg
dl-염산에칠에페드린(약전) 131mg
말레인산클로르페니라민(약전) 15mg
염화암모늄(비피) 1g
데히드로초산나트륨 10mg
파라옥시안식향산메칠 50mg
파라옥시안식향산프로필 20mg

[성상] 옅은 적색의 방향성 시럽제

[효능·효과] 기침, 가래

[용법·용량]

1일 3~4회 식후 및 취침시 복용하며 1회 복용량은 다음과 같습니다.
성인 20mL, 11~14세 13mL, 8~10세 10mL, 5~7세 7mL, 3~4세 5mL,
1~2세 4mL, 3개월 이상 1세 미만 2mL

※민약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
(소비자상담실:080-024-1188)

※빈 용기는 분리수거하여 주십시오.

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※본 라벨문안 작성일자(2006년 7월 18일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실 (080-024-1188) 또는 홈페이지(www.yuhan.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



제조번호 :

사용기한 :



분리배출
뚜껑:OTHER

SH319665/01