



진해·거담제 — 코두정

분류번호 : 222(진해거담제)

【성분·함량】 1정 중

주석산수소디히드로코데인(유에스피)	5.0mg
구아이페네신(약전)	50.0mg
dL-염산메칠에페드린(약전)	17.5mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.5mg

【성 상】 미황색의 원형 정제

【효능·효과】 기침, 가래

【용법·용량】

성인은 1회 2정씩 1일 3회 식후 복용합니다.

11~15세는 1회 1~2정씩, 8~10세는 1회 1정씩 1일 3회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다른 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예:발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자
- 5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용할때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 마십시오. 다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 4) 7세 이하의 소아에게는 시럽제를 복용시키십시오.
- 5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고, 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식용부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30)보관

【사 용 기 한】 외부포장에 표기

【포 장 단 위】 30정, 1,000정

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 개정년월일(2006년 8월 17일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-024-1188) 또는 홈페이지(www.yuhan.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



제조판매원

유한양행

 본사:서울시 동작구 대방동 49-6
 공장총복 청원군 오창읍 양창리 807-1

 www.yuhan.co.kr
 대표전화 : 828-0181
 소비자상담실 : 080-024-1188
 (수신자요금부담)