

골격근 이완제
마 토 크 주
(메토카르바몰)
Matok inj.

【원료약품 및 분량】

1mL 중
주성분 : 메토카르바몰(KP) 100mg
첨가제(안정제) : 아황산수소나트륨(KP) 1mg

【성상】 무색앰플에 든 무색투명한 주사액

【효능·효과】

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 경건완증후군, 건관절주위염, 변형성척추증

【용법·용량】

성인 : 메토카르바몰로서 1회 500mg을 근육 또는 정맥주사한다. 1회 1g, 1일 총투여량 3g을 초과하지 않으며 연속적으로 3일을 초과하여 투여하지 않는다. 단, 동통이 지속시 경우에 따라서 48시간후 주의하여 동일과정 을 반복할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상 주의사항】

1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의할것
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 신장에 또는 신장에가 의심되는 환자
3) 중증의 근무력증 환자
4) 혼수 또는 전훈수상태 환자
5) 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 간장에 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
2) 아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산 아니펄락시와 같은 알레르기를 일으킬 수 있으며, 일부 감수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 천식발작을 일으킬 수 있다. 일반 사람에서의 아황산감수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산감수성은 비천식 환자보다 천식환자에서 빈번한 것으로 나타났다.
4. 부작용
1) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 속유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우 에는 투여를 중지한다.
2) 순환기계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.
3) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 졸도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
4) 소화기계 : 때때로 구역·구토, 식욕부진, 가슴쓰림·위정체감·위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
5) 감각기계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다.
6) 기타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.
7) 주사부위 : 때때로 통증, 경결, 드물게 혈전성정맥염이 나타날 수 있다(주사제에 한함).
5. 일반적 주의
졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
6. 상호작용
1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비 탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
2) 염산플레리손과 병용투여시 시조절장치가 나타났다는 보고가 있다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
8. 소아에 대한 투여
영·유·소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어있지 않다.
9. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
10. 임상검사에 대한 영향
요중 5-히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.
11. 적용상의 주의
1) 경구투여가 부적당한 경우에만 주사를 사용한다.
2) 정맥주사시에는 생리식염주사액 또는 5%포도당주사액에 혼합하여 사용할 수 있으며, 단독투여할 경우 에는 분당 3mℓ이하의 속도로 직접 정맥에 주사한다.
3) 주사시에는 환자를 옆으로 눕어서 투여한다.
4) 앰플절단시 유리 미소편의 혼입을 피하기 위하여 에탄올면 등으로 대고 절단하여 사용한다.

【포장단위】 1앰플(5mL) × 10앰플

【저장방법】 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되었거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 1월 2일)이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 ezdrug.kfda.go.kr에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※ 고객센터실 : 080-221-2000(수신자부담)

작성년월일 : 2009. 1. 2



이연제약주식회사

본사: 서울·용산구 동빙고동 38-6
공장: 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL (02)793-5557, 5374