# 안티모딕™ 정 100mg

전문의약품

염산 티로프라미드 제제

**작 용 · 특 성 :** **안티모딕 정**은 위장관의 과다한 수축을 억제하여 복부통증을 비롯한 위장관 이상운동증의 여러 증상에 우수한 효과를 나타내는 위장관 운동 정상화제입니다.

**안티모딕 정**은 평활근 세포내 adenylcyclase 효소를 활성화시켜 c-AMP의 양을 증가시키며, 근육세포내의 칼슘저장소에 과잉의 칼슘이온을 저장시킴으로서 각종 평활근의 과도한 수축을 정상화시킵니다. 따라서 평활근 경련에 의한 위장관, 간담도, 신장, 요관의 산통 및 위장관 이상운동증후군에 의한 증상에 우수한 진경효과를 발휘하여 경련성 통증을 신속히 제거합니다.

**조 성 · 성 상 :** **1. 원료약품의 분량 :** 1정 중

염산 티로프라미드(별규) ····· 100mg

**2. 성상 :** 백색의 원형 필름코팅정

**효 능 · 효 과 :** **1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통**

간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장 · 요관 산통

**2. 다음 질환에서의 복부경련 및 동통**

위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

**용 법 · 용 량 :** **성인 :** 염산 티로프라미드로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

**사 용 상 의 주 의 사 항 :** **1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
2) 거대결장, 허탈환자
3) 이 약에 과민증 환자
4) 중증의 간부전 환자

**2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선 비대 환자에는 신중히 투여하십시오.

**3. 부작용**

1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.

**4. 상호작용**

혈압강하 약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하 효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.

**5. 임부에 대한 투여**

동물실험에서 임부나 태아에 대한 부작용을 나타내지는 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여하십시오.

**저 장 방 법 :** 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

**포 장 단 위 : 안티모딕 정** ····· 10정, 100정

구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

| 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다. |
|---|

**KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품**

TM = Trade Mark

I03 · 083100

종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)