

근육이완제 슬렌콘 정 250mg (카르바민산 클로르 페네신)

슬렌콘정은 척수의 Interneuron에 작용하여 Poly-Synapse 통로를 억제함으로써 골격근을 이완하는 약물로 주로 중추성 근육이완약으로 근육의 경련성 질환에 사용한다.

척수에 대한 선택작용이 있어 동물실험에서 수면을 일으키지 않는 용량에서 근육경련이나 강직을 완화시키는 작용이 있으며 작용지속 시간이 길다.

본제제는 Carbamate기를 갖고 있는 Propandiol 유도체로서 경축(痙攣)의 완화와 근육·골 및 관절장애와 관련이 있는 경축(痙攣)에 유효하다.

【원료약품의 분량】 1정중

슬렌콘정 : 카르바민산 클로르페네신(약전) 250mg

【성상】 백색의 원형정제

【약리작용】

1. 척수의 Interneuron에 작용하여 Poly-Synapse 통로를 억제함으로 골격근을 이완시키며 주로 경련성 강직 증상에 사용한다.
2. 중추성 근 이완약이므로 고위 중추에도 작용하여 항 불안효과도 있다.
3. 척수에 대한 선택작용이 있어 상용량에서 수면을 일으키지 않으며 근육 경련만을 완화시킨다.
4. 복용후 신속하게 흡수되어 1~3시간에 최고혈중농도에 달하고 반감기는 4시간이다.

【효능·효과】

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 변형성척추증, 추간판헤르니아, 척추분리, 전위증, 척추골다공증, 경견완증후군

【용법·용량】

성인 : 카르바민산클로르페네신으로서 1회 250mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 3년

【포장단위】 자사포장단위

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자 상담실 (031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수의약품제조관리기준
KGMP 적외선검출

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말것
 - 1) 이 약 및 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 간장애의 병력이 있는 환자
 - 2) 신장애 환자
3. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통, 두중감, 무력·권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 구역·구기, 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 2) 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)를 하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용

다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
7. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.