일반의약품

기침 · 가래 · 천식의 확실한 선택

두캅스-에이

연질캡슐

DUCAPS-A Soft Cap.

두캅스-에이 연질캡슐은 장기간 계속되는 만성적 기침을 빠르게 진정시켜주는 효과 빠른 진해거담제 입니다.
투명 연질캡슐속에 진해, 거담, 기관지 확장 성분이 고르게 배합되어 있어 기침으로 인한 인후 및 기관지의 통증을 해소시켜 주며, 휴대 및 복용이 간편하여 일상생활중 언제라도손쉽게 복용 할 수 있는 제제입니다.

■ **원료약품 및 그 분량**(1캡슐 중)

브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	15mg
염산노스카핀(약전)	20mg
염산트리메토퀴놀(약전)	2mg
구아이페네신(약전)	75mg
말레인산클로르페니라민(약전)	3mg

■ **성상** : 무색 또는 연녹색의 투명한 액상 내용물이 든 녹색의 투명 연질캡슐제

■ **효능 · 효과** : 기침, 가래, 천식

■ **용법 · 용량** : 성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1)본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알르레기성 비염, 편두통, 음식물 알르레기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
2)약으로 알레르기 증상(발열, 발질, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
3)간장애, 신장애, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
4)심장애 및 고혈압 환자, 고령자
5)녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자
6)의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 이상반응

1)이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2)이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

4. 일반적 주의

1)정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2)수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

5. 상호작용

다음 약들과 병용 투여하지 마십시오. : 다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등

6. 저장상의 주의사항

1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2)직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않도록 하십시오.

■ **포장단위** : 10, 300캡슐

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

200407

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해보상규정"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조원
경기도 화성시 향남면 상신리 906-6
알앤피코리아(주)

판매원
동성제약주식회사
[본사] 서울시 도봉구 방학동 703-14
[공장] 충남 아산시 둔포면 관대리 36-25
[소비자상담전화] 080-547-3571
www.dongsung-pharm.co.kr