



※ 이 문서는 본제를 사용함에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관 하십시오.

두통, 치통, 인후통, 생리통, 근육통

이즈펜 정

일반의약품

분류번호 : 114

이즈펜정은 (주)정우제약의 축적된 기술로 생약제제의 속효성이 떨어지는 문제를 보완하여 제품화한 진통제로 기존의 베리진정에 약자인 에텐자미드, 아세트아미노펜 등을 이상적으로 배합하여 만든 제품으로 근육통, 두통, 관절통 등이 나타나는 각종 통증성 질환과 발열시에 적용하므로서 신속하게 증상을 제거 또는 완화 시키는 해열 진통제입니다.

약리작용

1. 작약가루는 감초가루와 결합하여 강력한 진통, 진경작용을 함으로써 두통, 치통, 신경통, 관절통, 생리통 등에 확실하게 작용한다.
2. 아세트아미노펜은 감초가루, 작약가루와 결합하여 오한, 발열시에 진통 및 해열작용을 한다.
3. 에텐자미드는 해열, 진통작용을 함으로써 열을 내리고 관절의 통증을 가라 앉힌다. 보통 이 약은 Salicylamide의 2.5배정도의 진통력을 나타낸다.

【원료약품의 분량】 <1정(900mg) 중>

작약가루(약전)	125.0mg	아세트아미노펜(약전)	150.0mg
(패오니플로린으로서 2.5mg)		에텐자미드(약전)	250.0mg
감초가루(약전)	125.0mg	카페인(약전)	25.0mg
(글리시리진산으로서 3.13mg)			

【성 상】 갈색의 타원형 제피정

【효능·효과】

1. 두통, 치통, 발치후 동통, 인후통, 귀의 통증, 신경통, 관절통, 근육통, 요통, 건통, 타박통, 골절통, 염좌통, 월경통(생리통), 외상통의 진통
2. 오한, 발열시의 해열

【용법·용량】

1. 성인 : 1회 2정 , 1일 2회까지 공복시를 피하여 복용하십시오. 복용 간격을 6시간 이상으로 하십시오.
2. 어린이 1회 : 11~14세 1½정, 7~10세 1정

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.
 - 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
 - 2) 지금까지 약에 의해 알레르기증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세이하의 어린이.
 - 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
 - 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자.

- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
: 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 수화 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 3) 장기 연용하지 마십시오.
 - 4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하여 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
 - 5) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 - 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

(의약품안전과-11924호, 2004.06.25)

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원 등의 개설자를 통하여 교환하여 드립니다.

2006. 10. 작성



주식회사 정우제약

충남 아산시 신창면 읍내리 80-13 ☎(041)541-0471

http://www.pharm.co.kr