K G M P
적격업체제품

위장관운동촉진제

분류번호	239
전 문 의 약 품	

보니드정 BONID Tab.

(레보설피리드) (Levosulpiride)

소화불량(dyspepsia)은 지속적으로 또는 간헐적으로 반복되는 상복부통증이나 불쾌감을 말하는데, 이는 구체적으로 상복부 팽만감, 조기포만감, 속쓰림, 구역, 구토, 식욕부진, 트림 등을 의미합니다. 소화불량의 대부분은 위의 기질적 또는 기능적 이상으로 발생하며, 전체의 약 70%는 위장운동장애형 소화불량증으로서, 치료시에는 주로 위장운동촉진제를 사용하게 됩니다. 이 약(보니드정)은 중추신경전달물질인 도파민의 중추 및 말초 D_2수용체를 차단하여, 아세틸콜린분비를 정상화시킴으로서 위장운동을 촉진시킵니다. 이 약은 독성이 적은 반면에 항구토작용, 기능성 소화불량의 치료작용에 있어서는 기존의 Sulpiride, Metoclopramide, Domperidone보다 우수합니다.

【성 상】 백색의 원형정제

【성분 · 함량】 1정중

레보설피리드 (식약청고시) ····· 25mg

【약리 · 특장】

1. 위장운동촉진작용
   보니드정은 도파민 D_2수용체 길항제로서, 위장관운동을 활성화시켜, 위내용물을 빠르게 장으로 배출시킴으로서, 기능성 소화불량의 주 증상인 식후불쾌감, 복부팽만감, 속쓰림 등을 신속하게 완화시켜 줍니다. 따라서 기능성소화불량의 제1차 선택약으로 널리 사용되는 제제입니다.
2. 심리적 소화불량에도 효과
   중추성 항도파민작용으로, 스트레스, 우울, 불안 등의 심리적 요인으로 나타나는 소화불량 증상에도 효과를 나타냅니다.
3. 내약성
   추체외로증상 등 중추신경계부작용 및 설사, 복통과 같은 위장관계 부작용이 타제제에 비해 낮습니다.

【효능 · 효과】

기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 : 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

【용법 · 용량】

통상 성인 1회 1정, 1일 3회 식전복용

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포 장 단 위】 200, 500정(병)

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 임신중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 환자.
   2) 위장관운동자극이 유해한 환자 즉, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자.
   3) 갈색세포종환자에게는 이종양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발 할 수 있으므로 투여하지 말 것.
   4) 이 약에 과민성이 있거나 불내성인 환자.
   5) 간질환자, 조병(躁病)상태 및 조울병의 조병단계의 환자.
   6) 대부분의 향정신성의약품이 가지고 있는 프롤락틴 과분비 효과와 유방 형성 장해간에 상호관련성이 있다고 여겨지므로 악성유선증환자에게는 투여하지 말 것.

✲ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품일 경우 병 · 의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

(작성일자 : 2002. 1. 2)

제조발매원
JIN YANG PHARM.CO.
진양제약주식회사
경기도 안산시 초지동 649-3
소비자상담실 : (02) 3473-7185