

스마틴정

Smatin Tab.

현대처럼 다양화된 사회에서는 정신적Stress를 더 많이 받을 수 밖에 없으며 식사도 불규칙하거나 거를 수 밖에 없을 때가 많습니다. 이렇게 되면 위장기능의 이상이 생겨 소화가 안되고 불쾌감과 더부룩함, 속쓰림 등의 기능성 소화불량이 생기게 됩니다.

스마틴정은 위장관 운동을 촉진시키고 기능을 원활하게 하여 음식물을 위에서 장으로 신속히 이동시켜 이러한 증상을 없애주는 위장관 운동 촉진제입니다.

【원료약품의 분량】 1정중
레보설피리드 (식약청 고시) 25mg

【성 상】 백색의 원형정제

【약 리 작 용】

스마틴정의 주성분인

1. Levosulpiride는 위장기능이 저하되어 있는 기능성 소화불량의 1차 선택약으로 널리 사용되고 있습니다.
2. 스마틴정은 D_2 (Domperidone₂) Receptor Antagonist로서 위장근 신경총의 D_{2A} 수용체의 차단으로 위장관 운동을 활성화시켜 위 내용물을 장으로 신속히 배출시켜 식후 불쾌감, 복부팽만감, 속쓰림등을 완화시켜 줍니다.
3. 스마틴정은 혈뇌장벽(blood-brain barrier)을 통과하지 않으므로 추체외로 증상과 같은 신경학적 부작용이 없습니다.

【효능·효과】

기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 : 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

【용법·용량】

통상 성인 1회 1정 1일 3회 식전복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오
 - 1) 임신중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
 - 2) 위장관 운동자극이 유해한 환자 즉, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자
 - 3) 갈색 세포종환자에게는 이 증양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할수 있으므로 투여하지 마십시오
 - 4) 이 약에 과민성이 있거나 불내성인 환자
 - 5) 간질환자, 조병(조병)상태 및 조울병의 조병단계의 환자
 - 6) 대부분의 항정신성 의약품이 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방형성 장애간에 상호관련성이 있다고 여겨지므로 악성유선종환자에게는 투여하지 마십시오.
2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오
 - 1) 고혈압환자
 - 2) 소아(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의하십시오)
 - 3) 고령자
3. 부작용
 - 1) 내분비계
때때로 간뇌의 내분비기능조절이상(고나도트로핀분비 및 프로락틴분비이상)에 기인한다고 추정되는 무월경, 지속성유즙누출, 여성형 유방이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지하십시오.
 - 2) 추체외로계
드물게 진전, 혀의 굳어짐, 초조감등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지하십시오. 또 장기투여에 의해서 드물게 입주위 등에 불수의 운동이 나타나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있습니다.
 - 3) 소화기계
때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 순환계
고혈압이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 기타
드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지하십시오. 또한 때때로 열감, 권태감, 불면, 졸음, 현기, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 음위가 나타날 수 있습니다.
 - 6) 장기투여의 경우 무월경, 여성형 유방, 유즙분비과다 및 성욕의 증감과 같은 부작용이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이완제들과 유사하게 시상하부 뇌하수체, 생식선, 제2경추의 기능에 대한 효과로서 가역적입니다.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

우수약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 011101

설명서 개정일 050101

4. 일반적 주의

- 1)간뇌의 내분비기능조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙누출의 부작용이 있으므로 처방 전 반드시 이러한 부작용이 있음을 환자에게 주지시킵니다.
- 2)간뇌의 내분비기능조절이상, 추체외로 증상등의 부작용을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여합니다.
- 3)이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주위를 집중해야 하는 기계 조작을 피하는것이 좋습니다.

5. 상호작용

- 1)위장관운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린효능약(아트로핀, 메칠스코폴라민 등), 마약및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용하지 마십시오.
- 2)디기탈리스제제 포화시 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성화 할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여하십시오.
- 3)다른 벤즈아미드계 약제(메토클로프라미드, 티아프라이드 등)와의 병용에 의한 내분비 기능이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여하십시오.
- 4)정신약리학적 약물과의 병용투여는 상호작용에 기인한 예기치 않은 부작용을 피하기 위해 특별한 주의가 요구되며 알코올과 동시투여는 피해야 합니다.

6. 임부에 대한 투여

동물시험에서 태아에 대한 기형발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

7. 수유부에 대한 투여

신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오

8. 고령자에 대한 투여

주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 부작용(추체외로증상등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여하십시오.

9. 기타

- 1)진토작용이 있기 때문에 다른 약에 기인하는 중독, 장폐색, 뇌종양에 의한 구토증상이 나타나지 않게할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여합니다.
- 2)동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있습니다.
- 3)랫트 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선등의 종양발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있습니다.

【포 장 단 위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 사용기간 3년