전문의약품

The 1st selective serotonin 5-HT_4 agonist

가스모틴® 정 5mg

GASMOTIN

(Mosapride citrate 5mg)

가스모틴은 세계 최초 선택적 세로토닌 5-HT_4 수용체 효능제로 도파민 D_2 수용체 차단작용을 나타내지 않는 새로운 소화관 운동 항진제입니다.
가스모틴은 유사 약물에서 보고되는 심부정맥이나 도파민 D_2 수용체 차단작용에 의한 부작용(추체외로증상, 유즙분비 등)이 없는 안전한 약물입니다.

【특징 및 약리작용】

1. **가스모틴은 세계최초 선택적 세로토닌 5-HT_4 수용체 효능제 입니다.**
   강력한 소화관 운동 및 위배출 촉진 작용을 합니다.
2. **가스모틴은 도파민 D_2 수용체 차단 작용이 없습니다.**
   추체외로증상, 고프롤락틴혈증 (유즙분비, 여성화유방) 등의 부작용이 없습니다.
3. **가스모틴은 QT연장작용이 없습니다.**
   심부정맥의 부작용이 없습니다.
4. **가스모틴은 식전 · 식후 투여가 가능합니다.**
   식사와 무관하게 안정적으로 흡수됩니다.
5. **가스모틴은 신속한 약효 발현을 합니다**
   2주 투여로 소화기능 이상증상의 높은 개선효과를 나타냅니다.

【성분 · 함량】 - 1정 중 -
구연산모사프리드(별규) ····· 5.29mg
(구연산모사프리드 무수물로서 5mg)

【성　　상】
이 약은 분할선을 가진 백색의 장방형 필름코팅정제입니다.

【효능 · 효과】
기능성소화불량(만성위염)에 수반하는 소화기능이상 (가슴쓰림, 오심, 구토)

【용법 · 용량】
통상, 성인에게는 구연산 모사프리드 무수물로써 1일 15mg을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여합니다.

【사용상의 주의사항】
1.부작용
998예 중 40예(4.0%)에서 부작용이 나타났다. 주요한 부작용으로는 설사 · 연변(1.8%), 구갈(0.5%), 권태감(0.3%)등이 있습니다. 임상검사치에서는 792예 중 30예(3.8%)에서 이상변동이 보였습니다. 주요 내용으로는 호산구증다증(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST, ALT, ALP 및 γ-GTP의 상승 (각0.4%) 등이 있습니다.
1)중대한 부작용
간장 : AST, ALT, LDH, γ-GTP의 상승 등을 동반한 간기능 장애(0.1%미만), 황달이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 하십시오.
2)기타 부작용
과민증(부종, 발진, 두드러기), 설사, 연변, 구갈, 복통, 심계항진, 어지러움, 휘청거림, 두통, 권태감, 호산구 증가, 중성지방의 상승이 있습니다.
2.일반적 주의
일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화관증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 않습니다.
3.상호작용
이 약의 소화관운동 촉진작용은 콜린작동성 신경과의 관련성으로 인해 항콜린제(황산아트로핀, 브롬화 부틸스코폴라민 등)와 병용투여시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용간격을 두는 등 병용에 주의해야 합니다.
4.임부, 산부, 수유부에 대한 투여
1)임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다 (임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다).
2)수유중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단하십시오.
(실험동물에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있습니다)

5.소아에의 투여

소아 등에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 없습니다).

6.고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 부작용이 발현된 경우에는 감량(예, 1일 7.5mg)하는 등 적절한 처치를 한다.

7.기타

설치류에 임상통상용량의 100~300배(30~100mg/kg/일)를 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주간)에 있어 종창(간세포선종 및 갑상선여포성 종창) 발생률의 상승이 나타났었습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 100, 500, 1000정

【유효기간】 36개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정 중 변질, 변패 등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 소비자 보호법에 의한 피해보상규정(재정 경제부 고시 제 1996-3호)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불해 드립니다.

■ 제품 문의 전화 : (02)550-8329

■ 지역별 대웅제약 소비자 보호센타

서울 : (02)550-8308~9　　부산 : (051)466-6725~8

광주 : (062)263-7511~3　　대구 : (053)767-5581~3

대전 : (042)623-3356~8

주식회사 대웅제약
경기도 화성시 향남면 상신리 906-10

Processed under agreement with
DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.