KUKJE PHARMA IND. CO., LTD.

※2002년 7월 1일부터 제조물 책임법이 시행되고 있습니다.
부작용을 예방하고 올바른 약물복용을 위해 복용 전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 복용전 반드시 설명서를 주의깊게 읽으십시오.
2. 정해진 용법, 용량을 준수하십시오.
   (이 약을 장기간 복용할때는 반드시 의사나 약사와 상담하십시오.)
3. 다른 약물과 함께 복용할때는 미리 의사나 약사와 상담하십시오.
4. 어린이는 반드시 보호자의 지도감독하에 복용시킵시오.
5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
6. 습기와 열원(직사광선등)을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

[일반의약품]

고혈압성 · 당뇨병성 망막병증 치료제

타겐-에프 연질캡슐

(바키늄미르틸루스엑스 170mg)

타겐에프연질캡슐은 바키늄미르틸루스엑스를 성분으로 하는 제제로 당뇨병이나 고혈압등으로 인한 망막병증 및 각종 눈의 혈관장애에 사용할 수 있는 처방의약품입니다.
바키늄미르틸루스엑스의 주 성분인 안토시아노시드는 취약해진 모세혈관벽을 보호, 강화시켜 줄 뿐만 아니라 시신경 전달물질인 로돕신의 생성을 촉진하는 독특한 약리작용을 가지고 있어 이미 유럽에서는 널리 사용되어 효능을 인정받은 물질입니다. 특히 타겐에프연질캡슐은 기존 제품에 비해 바키늄미르틸루스엑스가 고단위로 함유되어 있어(170mg) 더욱 우수한 약물활성을 나타내는 제품입니다.

【성분 · 함량】 이 약 1캡슐중
주성분 : 바키늄미르틸루스엑스(식약청고시) ····· 170.0mg
(총 안토시아노시드로서 60.0mg)
보존제 : 파라옥시안식향산메칠(약전) ····· 0.24mg
파라옥시안식향산프로필(약전) ····· 0.06mg

【성 상】 흑갈색유상물이 든 양면 암갈색의 타원형 연질캡슐제

【효능 · 효과】
1. 당뇨병, 고혈압에 의한 망막변성 및 눈의 혈관장애 개선
2. 야맹증, 고도근시

【용법 · 용량】
1일 2-3회 1캡슐씩 식후 복용

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이 약에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   이 약은 황색 4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3. 부작용
   1) 소화기계 : 경미한 속쓰림, 구역 등 위장장애가 나타날 수 있습니다. 이 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 36개월

【포장단위】 90, 500 캡슐

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 사용기한 · 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품등은 약국등의 개설자를 통하여 본사 영업부(전화 : 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9)또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다
※ http : // www. kukjepharm. co. kr

가장 좋은 약은 사랑입니다.

제조발매원
국제약품공업주식회사
경기도 안산시 단원구 초지동 648번지

작성일 : 2002년 1월 15일