

비만 · 변비 개선

캠벨[®]

정

(방풍통성산건조엑스)

일반의약품

Cambel Tab.

분류번호 : 219(기타의 순환계 용약)

■ 성분 · 함량 1정중
방풍통성산건조엑스 (별규) 237.5mg

■ 성상 미색 내지 미황색의 원형필름코팅정

■ 효능 · 효과

복부에 피하지방이 많고 변비기가 있는 사람의 다음 증상
: 비만증, 변비, 고혈압의 수반증상(동계, 어깨결림, 역상), 부종

■ 용법 · 용량

성인 1일 3회, 1회 4정씩 식전 또는 식간에 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 임부 또는 임신한 가능성이 있는 부인 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축 작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있습니다.)
 - 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않습니다.)
- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
 - 부종이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 몸이 허약한 환자
 - 현저하게 위장이 허약한 환자
 - 지금까지 약에 의해 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 설사, 연변의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있습니다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있습니다.)
 - 현저하게 체력이 쇠약해진 환자 (부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있습니다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통, 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
 - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타난 경우
- 복용시 다음 사항에 주의하십시오.
 - 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
 - 다음의 약제와 병용하지 마십시오. : 다른 사하약(하제)
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프게이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드 게 이노제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
 - 본제의 복용에 의해 설사, 복통, 위부불쾌감, 발진, 발적 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상담하십시오.
 - 변비에 복용할 경우에 1주간 복용하여도 증상의 개선을 볼 수 없는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상담하십시오.
 - 변비 이외의 증상에 복용할 경우에 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선을 볼 수 없는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상담하십시오.
 - 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법 · 용량에 주의하십시오.
 - 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 합니다.
 - 다른 한방제제 등을 병용하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의하십시오. 대황함유제제는 병용투여시 특히 주의하십시오.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관 하십시오.
 - 오용을 피하고 품질을 보존하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 포장단위 180, 360, 500, 1000정 / 1포 (4정) × 45, 90, 180, 360

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술부로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 02-3415-7839)

작성년월일 : 2004 . 7 . 19

제조 · 판매원
대한뉴팜(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-3

30052897-01