

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약에 과민증 환자 2) 이 약을 유용함 없이 가지고 있으므로 갈락토제 불내성(galactose intolerance), Lapp의당분화소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당갈락토제 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2 이상반응 1) 소화기 : 드물게 구, 구강 등의 타박상 수 있으며 이러한 경우에는 간헐적 휴식 후의 적절한 처치로 된다. 2) 피부 : 알레르기반응이 나타날 수 있다. 3) 기타 : 드물게 두통, 발열, 복통 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 간헐 휴식 등의 적절한 처치를 한다. 3 상호작용 이 약은 진정작용을 나타내므로 모르면 또는 그 유도체와 같은 진통제와 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 동물실험에서 태독특성 및 기형발생은 나타내지 않았으나 임부 또는 임신하고 있는 여성이 있는 부인(특히 초 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 2) 수유증에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 본 제품은 우유와약물 제조 및 품질관리기준(KMP)에 따라 제조 및 품질검사를 하는 의약품이다. 만약 구입한 사용후처리에 겹쳐져서, 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약물을 통하여 교환하여야 된다.
- 6 기타 자세한 사항이나 청부문의 책임사항(2009년 10월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대체자료 작성일(080-855-0114)은 문의하지 바람.

청부문의 개정일: 2009년 10월 20일

【분류번호】 124

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중
 플로로글루신(KPC).....800mg
 파라옥시벤조산메틸(KP).....5mg
 파라옥시벤조산프로필(KP).....5mg

【성상】
 갈색 글라스병에 충전된 연한 갈색의 맑은액

【효능·효과】
 - 비뇨기계의 경련 및 통증 : 신염성 신통·
 - 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
 - 부인과의 경련성 통증
 - 임신중 수축의 보조제로

【용법·용량】
 - 성인·플로로글루신으로서 1회 160mg(20mL)을
 증상발현 시에 경구 투여한다.
 - 소아 : 1회 10mL를 1일 2회 투여한다.
 연한, 증상에 따라 적절한 증량을 한다.

【저장방법】
 차광기밀 용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500mL

* 본 제품은 '우수의약품 제조 및 품질관리기준
 (KQMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 한 의약품
 입니다. 만약 구입시 사용(유효기간이 경과하여거나), 변질
 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을
 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항은 첨부문서의 작성일자(2008년 05월 27일)
 이후 변경된 내용은 홈페이지(나) 대화제약 개발부(080-886-
 0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2008년 05월 27일

전문의약품

후로스판액

마시는 속효성 진경제

500mL



플로로글루신

마시는 속효성 진경제

FLOSPAN Soln.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
- 이상반응
 - 소화기계 : 드물게 구역, 구강 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 강강, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
 - 피부 : 알레르기반응이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 드물게 기분불량, 복식 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 강강, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
- 상호작용
 - 약은 진정작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물실험에서 태자독성 및 기형 발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.



8 '806456' 0224 10


분리배출


제조회사
대화제약주식회사
충청남도 천안시 동남구 대화로 100-1 5층
전화 041-240-1114 팩스 041-240-1115
<http://www.chpharm.co.kr>


제조회사
우리대생명과학
경기도 고양시 일산동구 일산로200-5

제조번호:

사용기한: