

바소트리정

(염산트리메타지딘)

VASOTRI Tablets

바소트리정은 항 허혈제로서 허혈세포의 대사작용을 정상화시킴으로써 심근, 와우 전정 및 맥락망막의 허혈에 효과적입니다. 허혈세포 내의 ATP농도를 개선시키고 이온 펌프의 기능을 정상화시킴으로써 세포의 전위차를 유지하고 산성증을 억제합니다. 허혈 상태에서 많이 생성되는 자유 산소 유리기(oxygen free radical)의 독성을 감소시켜 세포막을 보호하여 항 허혈제로써 특징을 나타냅니다. 협심증에 단독 혹은 병용요법으로 효과를 발휘하며, 허혈로 인한 맥락망막의 손상, 이명 등에 우수한 효과를 발휘할 뿐만 아니라 내약성도 뛰어납니다.

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

염산트리메타지딘(식약청고시)-----20mg

■ 성 상

주황색의 필름코팅 원형 정제

■ 효능 · 효과

1. 심혈관계 : 협심증
2. 안과 : 허혈로 인한 맥락망막 질환
3. 이비인후과 : 혈관성 어지러움, 메니에르병성 어지러움, 이명

■ 용법 · 용량

성인 : 염산트리메타지딘으로써 1회 20mg, 1일 2회 경구투여 합니다.
1일 60mg까지 증량할 수 있습니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용
 - 1) 정신신경계 : 때때로 두통, 권태감, 드물게 비틀거림 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 구역, 위부불쾌감, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 간장 : 드물게 ALT, AST상승 등이 나타날 수 있습니다.
2. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
 - 2) 모유로의 이행이 보고되지 않았으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
3. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다

■ 저장 방법 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서 작성일(2006년 01월 24일)이후 변경된 내용은
당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)의 제품소개에서 제품명을 클릭하거나
소비자 상담실(전화번호:080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.