■ 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중
L-카르보시스테인(약 전)---------- 375mg
소브레롤(식약청고시) ---------- 60mg

■ 성 상
백색 분말이 든 상부 녹색, 하부 연녹색 캡슐

■ 효능 · 효과
1. 다음 질환에서의 점액 및 점액농 분비물의 용해, 배출
   1) 기관지염, 기관지확장증, 기관지 폐렴, 특히 천식, 폐기종 등의 호흡기 부전이 수반될 때
   2) 폐결핵이나 진폐증이 수반되는 기관지카타르
   3) 비인두염, 후두기관염
2. 수술시 호흡기 합병증의 예방과 치료

■ 용법 · 용량
성인 1일 3회, 1회 1캡슐씩 복용

■ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증환자
   2) 위 · 십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 간장애 환자
   2) 심장애 환자
   3) 위 · 십이지장 궤양의 병력이 있는 환자
3. 부작용
   1) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 복부팽만감, 설사, 구갈, 위통, 드물게 위장관출혈, 가슴쓰림 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 과민증 : 발진, 홍반 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
   3) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진, 콧물, 전신압박감이 나타날 수 있습니다.

객담 배출의 KEY

브론키 캡슐

BRONKEY Capsules

200 캡슐

제조발매원
주식회사 동구제약
본사:서울특별시 구로구 고척2동 195-2
공장:경기도 화성시 향남면 상신리 901-3
www.dongkoo.co.kr

일반의약품
분류번호 222

KGMP
정부공인적격업체제품

8 806113 702631

4. 임부, 수유부, 소아, 고령자에 대한 투여
   1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
   2) 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
   3) 일반적으로 고령자는 생리 기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여하십시오.

■ 저장방법
밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

제조번호:

사용기한:

CN111803