

에 자 스 민 정

(로라타딘)

에자스민정은 Histamine, PGD₂, LTC₄ 알러지의 원인을 선택적이고 안전하게 차단하며 작용시간이 길고, 신속한 체내흡수 효과를 높인 비수기성 항히스타민제입니다.

원료약품 및 그 분량 : 1정 중

로라타딘(식약청고시 제2000-14호)..... 10mg

성상

백색의 타원형 정제

효능·효과

알레르기성 비염(재채기, 코막힘, 가려움, 눈의 작열감), 만성특발성 두드러기

용법·용량

- 성인 및 12세 이상의 소아 : 로라타딘으로서 1일 1회 1정(10mg)을 경구투여 한다.
 - 6~12세 미만의 소아 :
 - 체중 30kg 이상 : 이 약으로서 1일 1회 1정(10mg)을 투여한다.
 - 체중 30kg 이하 : 이 약으로서 1일 1회 ½정(5mg)을 투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자.
 - 2) 6세 미만의 환자.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것. - 간장애 또는 신부전 환자.
- 부작용
이 약과 위약과의 비교 임상시험에서 진정작용, 항콜린작용이 관찰되었고 피로, 구역, 두통, 빈맥, 실신, 구갈, 위장장애, 식욕증진 등이 보고되었다. 그 밖에 탈모증, 아나필락시스, 간기능장애, 상설성 부정빈맥 등이 나타난다.
- 일반적 주의
만일 피부자극 시험을 할 경우에는 항히스타민제제들이 피부반응 표시기에 양성반응을 방해 및 감소시킬 수 있으므로 피부시험 실시 약 4일 전에는 투여하지 마십시오.
- 상호작용
이 약과 시메티딘, 에리스로마이신, 케토코나졸, 퀴니딘, 플루코나졸, 플루옥세틴과 병용투여시 이 약의 대사가 저해되어 혈중농도가 높아진다.
- 임부·수유부에 대한 투여
 - 1) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
 - 2) 이 약이 모유중으로 이행되므로 수유중에는 투여하지 않는다.
- 과량투여시의 처치
과량을 투여했을 때에는 즉시 대증요법과 지지요법을 시작하여야 한다. 환자가 자발적으로 구토를 일으키지 않더라도, 구토를 유발시켜야 한다.(토근을 이용하는 방법이 우선적으로 사용된다.) 그러나 의식장애가 있는 환자에게 구토를 유도하여서는 안된다. 구토후에 활성탄과 물을 희석하여 투여할 수 있다.
만일, 구토가 성공적이지 못하거나 금기 사항일 경우는 위세척을 실시하여야 한다.
이 약은 투석으로는 제거되지 않습니다. 응급처치 이후 환자는 지속적으로 관찰되어야 한다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

◆ 본 의약품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.



제조·판매원 www.boramph.co.kr

보람제약주식회사

경기도 아산시 무내도 171

021018