전문의약품

티로신에스주사(트리트먼트코오스A)

【성 상】

무색 또는 엷은 황색액이 든 무색 바이알

【원료약품 및 그 분량】

1바이알(5ml)중

주 성 분 : 알러젠 추출물 ····· 1종 함유
흡 착 제 : L-티로신(E P) ····· 150밀리그람
등 장 화 제 : 염화나트륨(E P) ····· 적량
보 존 제 : 석탄산 0.5%W/V(BP) ····· 적량
완 충 제 : 인산염(EP)····· 적량
용 제 : 주사용증류수(EP) ····· 적량

No.1 바이알(5ml, green)은 No.2 바이알(5ml, red)의 1/8 희석액 함유
No.2 바이알은 최고 농도 함유.
매우 민감하거나 15세 미만의 소아인 경우 No.0 바이알(5ml, black)이 추가된다.
No.0 바이알은 No.2 바이알의 1/64 희석액 함유

【효능 및 효과】

IgE-mediated 알레르기에 기인한 알레르기성 건초열(알레르기성 비염), 알레르기성 결막염 또는 알레르기성 기관지 천식 등 알레르기성 질환 치료

【용법 및 용량】

바이알을 잘 흔들어서 섞어 준 후 약물을 취해 천천히 피하주사한다.
정맥 또는 근육주사하지 않고 주사부위를 문지르지 않는다.
7~14일 간격으로 다음과 같이 주사한다.

Vial No.	주 사 횟 수	투여량(mL)
1. 초록색 라벨 (1/8 dilution of No.2 Vial)	1	0.1
	2	0.2
	3	0.3
	4	0.5
	5	0.7
	6	1.0
2. 붉은색 라벨	7	0.1
	8	0.2
	9	0.3
	10	0.5
	11	0.7
	12	1.0

매우 민감하거나 15세 미만의 소아인 경우 No.0 바이알(검은색 라벨)이 추가되며, No.0 바이알을 다음과 같이 먼저 투여한 후 No.1 바이알(초록색 라벨)로 넘어간다.

Vial No.	주 사 횟 수	투여량(mL)
0. 검은색 라벨	1	0.1
	2	0.2
	3	0.4
	4	0.8

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   티로신혈증, 알캄토뇨증, 급성천식, 만성감염, 복합폐질환, 자가면역질환, 결핵성 알레르기 안질환, 면역결핍증, 베타차단제투여, ACE 억제제 투여
2. 부작용
   1) 주사부위가 붉게 부어오르거나 가려울 수 있으나 24시간 내에 소실되므로 별도로 치료치 않아도 된다.
   2) 드물게 눈주위가 가렵거나, 두드러기 증상, 가슴이 조이는 느낌이 들 수 있다.
   3) 보통 위 주사요법으로 아나필락시스, 전신알레르기 반응이 나타나지 않지만 만일 나타났을때에는 아드레날린으로 즉시 처치한다.
   4) 환자가 반응을 보일 경우 민감도에 따라 아드레날린으로 즉시 처치한다.
3. 일반적 주의
   1) 의사의 지시하에 투여하며 본제제 주사후 적어도 20분 동안 유의 관찰한다.
   2) 주사간격, 투여량을 준수하여 피하주사한다.
   3) 혈관, 근육내 주사하지 않는다.
   4) 급성감염, 고열, 급성천식환자에게는 투여하지 말고 그 증상이 회복된 후 24~48시간까지 기다린다.
   5) 주사시에는 아드레날린(1:1000) 주사를 항상 함께 준비한다.
   6) 한번 주사한 자리에 반복 주사는 피해야 한다.
   7) 주사 당일, 환자는 음주나 과식해서는 안되며, 격렬한 물리적 활동은 피한다.

【저장방법 및 사용기간】

1) 기밀용기, 2℃~8℃ 냉장 보관
2) 이 약은 동결시켜서는 안된다.
3) 사용기간 : 제조일로부터 12개월

【포장단위】

1셋트당(트리트먼트코오스)
No.1 바이알(초록색 라벨의 무색병) 5ml X 1바이알
No.2 바이알(붉은색 라벨의 무색병) 5ml X 1바이알
드문에이나 매우 민감하거나 소아인 경우 No.0 바이알이 추가된다.
No.0 바이알(검은색 라벨의 무색병) 5ml X 1바이알

제 조 원 : 영국 ALLERGY THERAPEUTICS LIMITED

수입 · 판매원 : 주식회사 신광신약
서울 · 강남구 역삼동 747-3 명우B/D 2층
TEL:554-1151~3 www.sknd.co.kr