



빠른흡수 · 빠른효과

하루펜 플라스타

일반의약품

분류번호:264

【원료약품의 분량】 (1매 중)

케토프로펜 (약진) 30mg

【성상】

이 약은 무색 반투명의 점착성 물질을 살색 부착포에 도포하고 고체면에 박리지를 덮은 경고제입니다.

【효능·효과】

다음 질환 및 증상의 진통 · 소염

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 1) 퇴행성 관절염 (골관절염) | 2) 어깨관절주위염 | 3) 건 · 건초염 |
| 4) 건주위염 | 5) 상완골상과염 (데니스앨로우 등) | 6) 근육통 |
| 7) 외상후의 종창, 동통 (타박, 좌상, 염좌 등) | | |

【용법·용량】 약면의 박리지를 떼어낸 후 환부에 1일 2회 부착하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약 및 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 아스피린 천식 (비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 기관지 천식 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 부작용

- 과민증:드물게 아나필락시양증상(두드러기, 호흡곤란, 안면부종 등)이 나타나는 경우가 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하십시오.
- 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음, 천명, 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다.
- 피부: 때때로 발적, 발진, 가려움, 수포 · 짓무름, 자극감 및 종창 등의 접촉 피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 적시알광(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 파진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지하십시오.

4. 일반적 주의

- 소염진통제에 의한 치료는 오피오이드가 아니라 대증요법이라는 점을 유의하십시오.

2) 피부의 감염증을 불현성화시킬 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의하십시오.

3) 만성질환(퇴행성 관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현에 유의하십시오.

4) 1주일 정도 사용하고도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와상의하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신말기의 랫트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태아의 동맥혈관 수축이 보고되었습니다.
- 임신 후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다.
- 임부, 산부 및 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 산부 및 수유부에 대해서는 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피하십시오.

6. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아, 영아, 유아 및 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용 경험이 적습니다.)

7. 적용상의 주의사항

- 눈 및 점막에 사용하지 마십시오.
- 손상된 피부 및 정맥, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의하십시오.
- 무릎, 백선 등에는 사용하지 않습니다.
- 밀봉봉대법을 사용하지 않습니다.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃), 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개찰자에 한하여 당사 담당 영업 사원을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 02) 2211-6700, www.sinilpharm.com